

Pluscard Tabletki 60 sztuk

Cena: 18,80 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PLUSCARD
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zakrzepy
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Pluscard to lek, który łączy kwas acetylosalicylowy, redukujący skłonność płytek krwi do "zlepiania się", oraz glicynę, która ma funkcję ochronną dla przewodu pokarmowego przed potencjalnie drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego, a także pomaga w lepszym wchłanianiu tego składnika.

Wskazania

Zapobieganie powikłaniom:

- zakrzepowo-zatorowym po przebytych zawale mięśnia sercowego,
- udarze mózgu,
- zabiegach na naczyniach wieńcowych,
- w dławicy piersiowej.

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego.

Działanie

Przeciwwzakrzepowe.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 16 lat: doustnie 1-3 tabletek na dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych. tabletki należy przyjmować w czasie, lub po posiłku i popijać szklanką płynu.
- Osoby w podeszłym wieku: nie ma dokładnych danych na temat stosunku korzyści do ryzyka stosowania kwasu acetylosalicylowego (ASA) w tej grupie pacjentów.
- Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby: należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu leczniczego u

pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i (lub) wątroby.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancje czynne: kwas acetylosalicylowy 100 mg oraz glicyna 40 mg,
- substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, talk.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pulscard:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, glicynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku nadwrażliwości na salicylany lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. astma aspirynowa, gorączka sienna,
- jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, dnę moczanową, ciężką niewydolność wątroby, nerek, serca

u osób z zwiększoną skłonnością do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie lekami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną),

- jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (choroba genetyczna krwinek czerwonych), gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może spowodować hemolizę – niszczenie krwinek czerwonych lub niedokrwistość hemolityczną – niedokrwistość spowodowaną nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych,
- u kobiet w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży),
- u dzieci poniżej 16 lat.

Działania niepożądane

- Zaburzenia serca: niewydolność serca.
- Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Pulscard należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

- występują utrzymujące się objawy dzwonienia lub szumu w uszach oraz ból głowy, gdyż w przypadku długotrwałego stosowania leku mogą one wskazywać na jego przedawkowanie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku,
- planowany jest zabieg chirurgiczny, to należy odstawić lek na 5 do 7 dni wcześniej, aby ograniczyć ryzyko wydłużonego czasu krwawienia podczas oraz po zabiegu,
- występują krwotoki maciczne, nadmierne krwawienia miesiączkowe, stosowana jest wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna,
- pacjent chorował na wrzody żołądka lub dwunastnicy.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

