

Poldanen, tabletki powlekane, 30 tabletek

Cena: 46,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	POLDANEN
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Drogi moczowe, PROBLEM, Prostate
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Poldanen to lek wspomagający w zaburzeniach oddawania moczu na wczesnym etapie przerostu prostaty.

Wskazania

Poldanen stosuje się u mężczyzn z trudnościami w oddawaniu moczu spowodowanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego.

Działanie

Poldanen stosuje się u pacjentów z łagodnym przerostem gruczoły krokowego (prostaty), we wczesnym stadium choroby w celu łagodzenia objawów takich jak: częste oddawanie moczu, konieczność oddawania moczu w nocy, utrudnione oddawanie moczu, oddawanie moczu kroplami.

Dawkowanie

Dorośli: doustnie, 2 razy dziennie po 2 tabletki w czasie posiłku przez co najmniej 4 tygodnie.

Skład

- Substancją czynną jest wyciąg z kory śliwy afrykańskiej (*Pruni africanae corticis extractum spissum*)
- 1 tabletka zawiera 46 mg wyciągu gęstego z kory śliwy afrykańskiej
- Substancje pomocnicze: wapnia fosforan, skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa lak E 110.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Poldanen:

- przy nadwrażliwości na wyciąg z kory śliwy afrykańskiej lub na rośliny z rodziny różowatych (*Rosaceae*) lub którykolwiek z

- pozostałych składników leku,
- u pacjentów z rozpoznanym nowotworem gruczołu krokowego.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Poldanen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Podczas stosowania leku Poldanen mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaleca się stosować lek podczas jedzenia).

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku Poldanen należy omówić jego zastosowanie z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
- Rozpoznanie przerostu gruczołu krokowego musi ustalić urolog.
- Poldanen nie hamuje przerostu gruczołu krokowego, zmniejsza jedynie dolegliwości z nim związane.
- Jeśli podczas stosowania objawy nasiliły się lub pojawiły się nowe, stwierdził się obecność krwi w moczu lub nastąpi nagłe zatrzymanie moczu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Poldanen zawiera sacharozę (pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów) i żółcień pomarańczową lak E 110 (może powodować reakcje alergiczne).
- Lek Poldanen należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

HERBAPOL POZNAN
Towarowa 47-51
Poznań

Galeria

