

Polocard, 75 mg, tabletki dojelitowe, 60 tabletek

Cena: 28,31 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	POLOCARD
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zakrzepy
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Lek Polocard 75 mg w opakowaniu zawierającym 60 tabletek, jest dostępny w formie tabletek dojelitowych i przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży powyżej 16. roku życia. Głównym składnikiem aktywnym tego leku jest kwas acetylosalicylowy. Działając w niewielkich dawkach, kwas ten hamuje proces agregacji płytek krwi, co odgrywa istotną rolę w profilaktyce powstawania zakrzepów

Wskazania

Wskazaniami do stosowania Polocard 75 mg jest profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Działanie

Substancja czynna leku Polocard 75 mg, kwas acetylosalicylowy, podawana w małych dawkach hamuje agregację płytek krwi.

Dawkowanie

- Osoby dorosłe: 1-2 tabletki 75 mg na dobę.
- W świeżym zawałe serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca: od 225 mg (3 tabletki po 75 mg) do 300 mg (4 tabletki po 75 mg) raz na dobę.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 75 mg,
- substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu

metakrylowego trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polocard 75 mg:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;
- jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;
- jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;
- jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie choroby wrzodowej);
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną);
- jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);
- jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny.

Działania niepożądane

- odczyny skórne,
- pokrzywki,
- świąd,
- zawroty głowy i szumy uszne,
- niewydolność serca,
- nadciśnienie tętnicze,
- zgaga,
- nudności i wymioty,
- bóle brzucha,

Ostrzeżenia

- Lek Polocard 75 mg zawiera czerwień koszenilową, może powodować reakcje alergiczne.
- Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów.
- Przed planowanym zabiegiem chirurgicznym pacjent powinien powiadomić lekarza o przyjmowaniu leku Polocard 75 mg.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

POLPHARMA OTC
Pełplińska 19
Starogard Gdański