

Polopiryna C, tabletki musujące, 10 tabletek

Cena: 23,16 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	POLOPIRYNA
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki musujące
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Ból, Gorączka, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Polopiryna C to lek przeznaczony do łagodzenia bólu różnego pochodzenia oraz obniżania gorączki związanej z przeziębieniem. Posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Wskazania

- Bóle o słabym lub średnim nasileniu (np. ból głowy, bóle mięśniowe i stawowe, inne bóle),
- Gorączka (przeziębienie, zakażenia wirusowe, inne choroby).

Działanie

Polopiryna C wykazuje działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne. Zawiera również witaminę C, której występuje zwiększone zapotrzebowanie w okresie choroby i zdrowienia.

Dawkowanie

- Dorośli: jednorazowo 1-2 tabletki. Dawkę można powtórzyć 2-3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek na dobę.
- Młodzież powyżej 12 lat: 1-2 tabletki na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi są: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum), witamina C - kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).
- 1 tabletkę zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego oraz 200 mg kwasu askorbowego.

- Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polopiryna C:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs;
- jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczyńnioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;
- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);
- jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych (ospa wietrzna, grypa), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu;
- w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.
- w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego, na skutek działania czynników zewnętrznych (dostęp powietrza i wilgoć) zawarta w tablecie

witamina C ulega stopniowemu utlenieniu co prowadzi do zmiany barwy tabletki z białej na brązową. Tabletki o zmienionym kolorze nie może być stosowana.

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- małopłytkowość, leukopenia, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień,
- reakcje nadwrażliwości - wysypka, pokrzywka, skurcz oskrzeli,
- szumy uszne, zaburzenia słuchu, zawroty głowy, zmęczenie, uczucie palenia za mostkiem, bezsenność lub senność,
- niewydolność serca,
- nadciśnienie, zaczerwienienie twarzy,
- niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, uszkodzenia błony śluzowej żołądka,
- przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, stężenia bilirubiny,
- białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku: zaburzonej czynności nerek, młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów, krwotoków, nadmiernego miesiączkowania, stosowania wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, gdy pacjent przyjmuje metotreksat (mniej niż 15 mg na tydzień).
- Nie należy stosować Polopiryny C i doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonilomocznika ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego oraz gdy pacjent przyjmuje leki stosowane w dniu moczanowej.
- Stosowanie leku należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.
- Nie należy łączyć leku z alkoholem - ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.
- U osób starszych występuje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
- Omeprazol nie wpływa na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego.
- Polopiryna C zawiera sód - produkt zawiera około 356 mg sodu w tablecie, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

POLPHARMA OTC



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Pelplińska 19
Starogard Gdański