


Polopiryna Max, 500 mg, tabletki dojelitowe, 10 tabletek

Cena: 14,01 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	POLOPIRYNA
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki dojelitowe
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Polopiryna Max to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym, stosowany w przypadkach bólu różnego pochodzenia (takiego jak ból głowy, zębów, mięśni, stawów), gorączki oraz reumatyzmu.

Wskazania

- Ból i dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu, m.in. ból głowy, ból zębów, ból mięśni, ból stawów,
- Gorączka i dolegliwości związane z przeziębieniem i grypą,
- Reumatoidalne zapalenie stawów (jedynie na zlecenie lekarza)

Działanie

Polopiryna Max zawiera kwas acetylosalicylowy, który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli: 1-2 tabletki (500-1000 mg). Dawkę można powtórzyć 2-3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 g, czyli 6 tabletek.

Skład

- Substancją czynną jest: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).
- 1 tabletki dojelitowa zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.
- Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana; skrobia kukurydziana modyfikowana; hypromeloza; kopolimer kwasu metakrylowego; talk; tytanu dwutlenek (E171); trietylu cytrynian; czerwień koszenilowa, lak (E124); krzemionka koloidalna bezwodna; sodu wodorowęglan; sodu laurylosiarczan.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polopiryna Max:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku uczulenia na inne leki z grupy NLPZ,
- jeśli pacjent cierpi na astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną, obrzęk błony śluzowej nosa,
- w przypadku czynnej choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, stanów zapalnych lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek, serca,
- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia oraz gdy stosuje leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny, heparyna),
- w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej,
- jeśli pacjent przyjmuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
- u osób poniżej 16 lat,
- w okresie III trymestru ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- zmniejszenie liczby płytek krwi,
- niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego,
- zmniejszenie liczby białych krwinek, neutrofili, granulocytów kwasochłonnych,
- zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu krzepnięcia krwi,
- nadwrażliwość na leki, skurcz oskrzeli, obrzęk alergiczny i obrzęk naczyńioruchowy, reakcje anafilaktyczne,
- szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy,
- krwawienia mózgowie i wewnątrzczaszkowe,
- nadciśnienie, krwawienia, krwawienia operacyjne, krwiaki, krwawienia mięśniowe,
- krwawienia z nosa, astma analgetyczna, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa,
- niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego,
- uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje, krwawienia dziąseł, stany zapalne przewodu pokarmowego,
- tkliwość i powiększenie wątroby,
- wysypka, pokrzywka, świąd,
- obecność białka w moczu, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu,
- krwawienia w obrębie układu moczopłciowego,
- zaburzenie czynności nerek.

Ostrzeżenia

- U pacjentów w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych.
- Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku: zaburzeń czynności nerek i/lub wątroby, krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zażywania niektórych leków (metotreksat, leki przeciwcukrzycowe, leki stosowane w dnie moczanowej), w okresie I i II trymestru ciąży.
- Stosowanie leku odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na wydłużony czas krwawienia.
- Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do zaburzonej czynności nerek.
- Lek zawiera czerwień koszenilową, lak (E 124), które mogą powodować reakcje alergiczne.

Producent

POLPHARMA OTC
Pełplińska 19
Starogard Gdański