

# Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 kapsułek

Cena: 25,80 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn            |
| Opakowanie      | 14 kapsułek                         |
| Postać          | Kapsułki                            |
| Producent       | ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. |
| Przeznaczenie   | Nadkwaśność, Refluks, Wrzody, Zgaga |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                     |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów         |

## Opis produktu

### Opis

**Polprazol Max** to produkt leczniczy stosowany w leczeniu objawowej zgagi i refluksu. Lek ten zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

### Wskazania

Polprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych.

### Działanie

Lek Polprazol Max ma działanie polegające na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

### Dawkowanie

Zalecane dawkowanie to 1 kapsułka raz na dobę przez 14 dni.

### Skład

- Substancją czynną jest: omeprazol (Omeprazolum).
- Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu.
- Substancjami pomocniczymi są: sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę i skrobię kukurydzianą), powidon K30, sodu laurylosiarczan, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), trisodu fosforan dwunastowodny, hypromeloza 6 cP, trietylu cytrynian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, tytanu dwutlenek (E171), talk, erytrozyna (E127), indygotyna (E132), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona, żelatyna, żółcień chinolinowa (E104), erytrozyna (E127), szelak, glikol propylenowy, poliwinylpirolidon,

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polprazol Max:

- jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

### Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (1 na 10 pacjentów):

- ból głowy,
- biegunka,
- nudności lub wymioty,
- łagodne polipy żołądka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (1 na 100 pacjentów):

- obrzmienia stóp i kostek,
- zaburzenie snu,
- uczucie zawrotu głowy, uczucie mrowienia i kłucie,
- odczucie wirowania,
- zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby,
- wysypka skórna,
- złe samopoczucie ogólne oraz brak energii.

Rzadko występujące działania niepożądane (1 na 1000 pacjentów):

- reakcje alergiczne,
- zmiany odczuwania smaku,
- suchość w jamie ustnej,
- uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia,
- bóle stawów lub bóle mięśni,
- zwiększona potliwość.

### Ostrzeżenia

- Polprazol Max zawiera sacharozę, sól i erytrozynę.
- Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza o planowanym specyficznym badaniu krwi.
- Nie należy przyjmować leku Polprazol Max przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (nieuzasadniona utrata masy ciała, utrudnione połykanie, pojawienie się wymiotów z krwią, oddawanie czarnych stolców, wystąpienie żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

### Producent

POLPHARMA SA  
Pełplińska 19  
83-200 Starogard Gdański

## Galeria