

Procto-Glyvenol, (50 mg + 20 mg)/g, krem doodbytniczy, 30 g

Cena: 24,66 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 g
Postać	krem
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwozrękowe, Przeciwświądowe, Przeciwzapalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Procto-Glyvenol to preparat w formie kremu doodbytniczego, przeznaczony do leczenia hemoroidów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wykazuje kompleksowe działanie: tribenozyd łagodzi ból, świąd, obrzęk oraz stany zapalne, natomiast lidokaina zapewnia miejscowe znieczulenie. Lek może być stosowany przez osoby dorosłe, a także kobiety po czwartym miesiącu ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku Procto-Glyvenol jest miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

Działanie

Lek Procto-Glyvenol zawiera dwie substancje czynne i działa wielokierunkowo na hemoroidy. Krem wywiera efekt przeciwzapalny, przeciwozrękowy, przeciwbólowy, przeciwświądowy dzięki zawartości tribenozydu, który również przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego. Dodatkowo Procto-Glyvenol zawiera lidokainę miejscowo znieczulającą i łagodzącą dolegliwości spowodowane hemoroidami.

Dawkowanie

Lek Procto-Glyvenol stosuje się rano i wieczorem aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć do 1 aplikacji kremu na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są tribenozyd (Tribenosidum) i lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum).
- 1 g kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku.
- Substancje pomocnicze: sorbitanu stearynian (Arlacel 60, makroglu eter cetostearylowy (Cetomakrogol 1000), alkohol cetylowy, izopropylu palmitynian, parafina ciekła, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, kwas stearynowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania



Nie stosować leku Procto-Glyvenol u osób uczulonych na tribenozyd, lidokainy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, albo na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.

Działania niepożądane

- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób): pokrzywka, świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, ból w miejscu podania.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób): reakcja anafilaktyczna, zaburzenia sercowo-naczyniowe, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy.

Ostrzeżenia

- Procto-Glyvenol zawiera alkohol cetylowy, metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, może to powodować miejscową reakcję skórą.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
- W uzupełnieniu leczenia hemoroidów lekiem Procto-Glyvenol, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca.
- Nie wolno stosować leku doustnie.
- Należy unikać kontaktu z oczami.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

RECORDATI IRELAND LTD
Raheens East
Ringaskiddy, Co. Cork, Irlandia