

Procto-Glyvenol krem 30g

Cena: 37,45 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PROCTO-GLYVENOL
Opakowanie	30 g
Postać	krem
Producent	RECORDATI IRELAND LTD.
Przeznaczenie	Hemoroidy
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Procto-Glyvenol to lek dostępny w postaci kremu doodbytniczego, przeznaczony do miejscowego leczenia zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych hemoroidów. Jego kluczową substancją czynną jest Tribenozyd, który posiada działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, przeciwbólowe, przeciwświądowe oraz chroni śródbłonek naczyń krwionośnych przed uszkodzeniami. Krem zawiera również lidokainę, substancję miejscowo znieczulającą, która pomaga łagodzić dolegliwości związane z hemoroidami, takie jak świąd, pieczenie i ból.

Lek Procto-Glyvenol działa bezpośrednio w miejscu zastosowania, nie wykazując ogólnoustrojowych efektów. Może być stosowany od 4. miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią, pod warunkiem przestrzegania zalecanych dawek.

Wskazania

Lek Procto-Glyvenol stosuje się w celu:

- miejscowego leczenia zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

Działanie

Lek Procto-Glyvenol zawiera dwie substancje czynne i działa wielokierunkowo na hemoroidy. Krem wywiera efekt przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwbólowy, przeciwświądowy dzięki zawartości tribenozydu, który również przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego. Dodatkowo Procto-Glyvenol zawiera lidokainę miejscowo znieczulającą i łagodzącą dolegliwości spowodowane hemoroidami.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza, lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Procto-Glyvenol stosuje się doodbytniczo. W przypadku występowania ostrych objawów krem należy aplikować 2 razy na dobę - rano i wieczorem.

Następnie, po ich ustąpieniu, 1 raz na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku.

Należy unikać kontaktu leku z oczami.

W przypadku hemoroidów wewnętrznych do nakładania kremu należy wykorzystać załączony do opakowania aplikator.

Przed aplikacją kremu, aplikator należy nakręcić na gwint tuby i zdjąć z niego kapturek ochronny, który po aplikacji należy ponownie umieścić na swoim miejscu.

Każdorazowo po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Skład

1 g kremu doodbytniczego zawiera:

- substancje czynne: tribenozyd (Tribenosidum) 50 mg, lidokaina chlorowodoru (Lidocaini hydrochloridum) 20 mg,
- substancje pomocnicze: sorbitanu stearynian (Arlacel 60); makrogolu eter cetostearylowy (Cetomakrogol 1000); alkohol cetylowy; izopropylu palmitynian; parafina ciekła; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; sorbitol ciekły, niekrystalizujący; kwas stearynowy; woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Procto-Glyvenol u osób uczulonych na tribenozyd, lidokainy chlorowoderek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, albo na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.

Działania niepożądane

- pokrzywka,
- świąd, wysypka, ból występujące w miejscu podania.

Ostrzeżenia

- Procto-Glyvenol zawiera alkohol cetylowy, metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, może to powodować miejscową reakcję skórą.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
- W uzupełnieniu leczenia hemoroidów lekiem Procto-Glyvenol, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca.
- Nie wolno stosować leku doustnie.
- Należy unikać kontaktu z oczami.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.