

Procto-Glyvenol krem doodbytniczy INPHARM, 30g

Cena: 39,22 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 g (tub.)
Postać	Krem doodbytniczy
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwozrętkowe, Przeciwswiądowe, Przeciwzapalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Procto-glyvenol to krem doodbytniczy przeznaczony do leczenia hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych. Działa wielokierunkowo, dzięki tribenozydowi, który ma właściwości przeciwbólowe, przeciwswiądowe, przeciwozrętkowe i przeciwzapalne, oraz lidokainie, która zapewnia miejscowe znieczulenie. Krem może być stosowany przez dorosłych oraz po czwartym miesiącu ciąży i w okresie laktacji.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku Procto-Glyvenol jest miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

Działanie

Lek Procto-Glyvenol zawiera dwie substancje czynne i działa wielokierunkowo na hemoroidy. Krem wywiera efekt przeciwzapalny, przeciwozrętkowy, przeciwbólowy, przeciwswiądowy dzięki zawartości tribenozydu, który również przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego. Dodatkowo Procto-Glyvenol zawiera lidokainę miejscowo znieczulającą i łagodzącą dolegliwości spowodowane hemoroidami.

Dawkowanie

Lek Procto-Glyvenol stosuje się rano i wieczorem aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć do 1 aplikacji kremu na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są tribenozyd (Tribenosidum) i lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum).
- Substancje pomocnicze: sorbitanu stearynian (Arlacel 60, makrogolu eter cetostearylowy (Cetomakrogol 1000), alkohol cetylowy, izopropylu palmitynian, parafina ciekła, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol ciekły, niekryształujący, kwas stearynowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania



Nie stosować leku Procto-Glyvenol u osób uczulonych na tribenozyd, lidokainy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, albo na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.

Działania niepożądane

- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób): pokrzywka, świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, ból w miejscu podania.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób): reakcja anafilaktyczna, zaburzenia sercowo-naczyniowe, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy.

Ostrzeżenia

- Procto-Glyvenol zawiera alkohol cetylowy, metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, może to powodować miejscową reakcję skórą.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
- W uzupełnieniu leczenia hemoroidów lekiem Procto-Glyvenol, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca.
- Nie wolno stosować leku doustnie.
- Należy unikać kontaktu z oczami.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

AVRENTIM/RECORDATI
Szyszkowa 11
Warszawa