

Procto-Hemolan Krem doodbytniczy 20 g

Cena: 25,80 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PROCTO-HEMOLAN
Opakowanie	20 g
Postać	krem
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Hemoroidy
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Procto-Hemolan to krem doodbytniczy, który został stworzony jako lek na hemoroidy, mający na celu leczenie i łagodzenie objawów związanych z żylakami odbytu. Produkt skupia się na redukcji dolegliwości takich jak ból, pieczenie, swędzenie i napięcie skóry w okolicach odbytu. W jego składzie znajduje się lidokaina, która działa jako silny środek znieczulający, przynosząc szybką ulgę w przypadku uciążliwych objawów takich jak ból, pieczenie i swędzenie.

Kluczowym składnikiem kremu jest tribenozyd, który działa na kilka sposobów. Redukuje stany zapalne związane z hemoroidami, ogranicza przepuszczalność naczyń krwionośnych oraz poprawia napięcie ściany naczyniowej. Ponadto w pewnym stopniu przeciwdziała również tworzeniu się zakrzepów. Dzięki tym działaniom, krem Procto-Hemolan skutecznie zwalcza przyczyny dolegliwości i chroni przed ich nawrotem.

Wskazania

Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu.

Działanie

Lecznicze i łagodzące na objawy spowodowane żylakami odbytu (pieczenie, swędzenie, ból, napięcie skóry).

Dawkowanie

Dorośli: stosować 2 razy na dobę - rano i wieczorem. Zaleca się stosowanie pasma 1 cm leku. Lek aplikować na miejsce zmienione chorobowo.

Skład

1g kremu zawiera:

- substancje czynne: tribenozyd 50mg, chlorowodorek lidokainy 20mg,
- substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, kwas stearynowy, parafina ciekła, izopropylu palmitynian, makrogolu eter cetostearylowy, sorbitanu stearynian, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol, ciekły

niekryształujący, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Procto-Hemolan:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku gdy pacjent wykazuje nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające (np. stosowane do znieczuleń w stomatologii).

Działania niepożądane

- uczucie lekkiego pieczenia,
- ból,
- nasiloną perystaltyka jelit.

Ostrzeżenia

- Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpiła poprawa lub objawy nasiliły się, należy skonsultować się z lekarzem.
- Podczas stosowania leku należy zapobiegać zaburzeniom wypróżniania.
- Lek zawiera alkohol cetylowy, który może powodować miejscową reakcję skórą, np. kontaktowe zapalenie skóry.
- Lek zawiera parahydroksybenzoesan metyli i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne, również typu późnego.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

