

Proktosedon maść 15 g

Cena: 30,59 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PROKTOSEDON
Opakowanie	15 g
Postać	Maść
Producent	POLMEX SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból, Hemoroidy, Stan zapalny
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Proktosedon to lek złożony dostępny w postaci maści doodbytniczej, który zawiera skomponowane działanie różnych substancji aktywnych. W skład maści wchodzi:

- Hydrokortyzon, który działa przeciwzapalnie,
- Cynchozaina, mająca lokalne działanie znieczulające,
- Neomycyna, antybiotyk o szerokim spektrum działania, leczący miejscowe infekcje wywołane przez bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz zapobiegający ponownym zakażeniom,
- Eskulina, ograniczająca krwawienia z naczyń i redukująca obrzęki.

Wskazania

Leczenie hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych, w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych odbytu, szczeliny odbytu i świądzie odbytu. Może być stosowana w okresie przed- i pooperacyjnym.

Działanie

Przeciwzapalne, miejscowo znieczulająco, bakteriobójcze, hamujące krwawienie z naczyń i zmniejszające obrzęki.

Dawkowanie

Dorośli: niewielką ilość maści należy nakładać za pomocą aplikatora rano, wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu.

Skład

1 g maści zawiera:

- substancje czynne: hydrokortyzon w postaci octanu (Hydrocortisonum) 5 mg, chlorowodorek cynchokainy (Cinchocaini hydrochloridum) 5 mg, siarczan neomycyny (Neomycini sulfas) 10 mg, eskulina w postaci półtorawodzianu (Esculinum) 10 mg,
- substancje pomocnicze: parafina ciekła, wazelina biała, lanolina bezwodna.



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Proktosedon:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent cierpi na: jaskrę, osteoporozę, zakażenia grzybicze lub wirusowe, cukrzycę, gruźlicę, zakrzepicę żylną.

Działania niepożądane

- pieczenie odbytu

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli równolegle z hemoroidami występują: zakażenia, alergia.
- Jeśli pacjent przyjmuje szczepienia lub leczenia immunizacyjne - nie stosować tego leku.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia, krwawienia, stosowanie leku należy przerwać.
- Długotrwałe stosowanie może wiązać się z wystąpieniem ogólnoustrojowych działań kortykosteroidów.
- W przypadku nieostrego widzenia lub innych zaburzeń widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.