

Prospan 26 mg, 20 pastylek miękkich

Cena: 29,95 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PROSPAN
Opakowanie	20 sztuk
Postać	Pastylki miękkie
Producent	ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO KG
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Prospan to lek roślinny w formie miękkich pastylek, który działa jako środek wykrztuśny na mokry kaszel. Należy do grupy leków wykrztuśnych, pomagających usuwać śluz i flegmę z dróg oddechowych, przynosząc ulgę w kaszlu. Pastylki Prospan są smaczne, miękkie i małe, co umożliwia łatwe stosowanie w dowolnym miejscu i czasie, bez potrzeby popijania.

Wskazania

Prospan – lek stosuje się u osób dorosłych:

- jako środek wykrztuśny w kaszlu produktywnym (kaszlu mokrym).

Działanie

Kapsułki Prospan wykazują działanie: przeciwzapalne, łagodzące kaszel, miejscowo rozkurczające (mięśnie gładkie oskrzeli w celu otwarcia dróg oddechowych) i rozluźniające wydzielinę (co ułatwia jej usunięcie).

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: 1 pastylka do ssania, 4 razy na dobę.
- Dzieci od 6. do 12. roku życia: 1 pastylka do ssania, 2 razy na dobę.

Skład

1 pastylka zawiera:

- substancję czynną: suchy wyciąg z liści bluszczu (*Hederae helicis folii extractum siccum*) 26 mg,

substancje pomocnicze: guma akacjowa 85%, sorbitol ciekły 70% niekrystalizujący (E420), maltitol ciekły 75%, kwas cytrynowy jednowodny (E330), acesulfam K, aromat pomarańczowy naturalny (olejek eteryczny pomarańczowy, etanol 0,008 g/pastylkę miękką), aromat Frescofort Permaseal (mentolowy) (naturalne substancje smakowe, maltodekstryna, skrobia modyfikowana), triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną leku, na inne rośliny z rodziny Araliaceae (araliowate) lub na dowolny z pozostałych składników leku.
- Nie należy podawać leku Prospan dzieciom poniżej 6. roku życia.

Działania niepożądane

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

- Dolegliwości przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

- Reakcje alergiczne: pokrzywka, wysypka, duszności, obrzęk, zaczerwienienie i swędzenie skóry.

Ostrzeżenia

- Nie należy przyjmować leku w pozycji leżącej.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować to z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku utrzymywania się dolegliwości, a także w przypadku pojawienia się duszności, gorączki, ropnego lub krwawego odkrztuszania, należy natychmiast udać się do lekarza.
- Przed jednoczesnym zastosowaniem leku Prospan z lekami przeciwkaszlowymi takimi jak kodeina lub dekstrometorfan należy skonsultować to z lekarzem.
- Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej żołądka lub wrzodem żołądka.
- Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.
- Lek Prospan nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6. roku życia.
- Prospan zawiera sorbitol i maltitol. W przypadku występowania u pacjenta nietolerancji niektórych cukrów, należy przed przyjęciem leku skonsultować się z lekarzem.

Producent

ENGELHARD ARZNEIMITTEL
Herzbergstr. 3, Niemcy
Niederdorfelden

Galeria

