

Pyralgina, 500 mg, tabletki, 12 tabletek

Cena: 22,34 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PYRALGINA
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Rozkurczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pyralgina to lek stosowany w przypadku silnych bólów oraz gorączki.

Wskazania

Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Działanie

Pyralgina zawiera metamizol sodowy, który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz rozkurczowe na mięśnie gładkie. Metamizol należy do nieopiodowych leków przeciwbólowych z grupy pochodnych pirazonu.

Dawkowanie

Osoby dorosłe: bóle sporadyczne i gorączka: 1 tabletkę (500 mg) do 2 tabletek (1000 mg).

- Maksymalna dawka jednorazowa to 2 tabletki (1000 mg metamizolu).
- Maksymalna dawka dobową to 6 tabletek (3000 mg metamizolu).
- Nie stosować leku dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Skład

- Substancją czynną jest: metamizol sodowy (Metamizolum natrium).
- 1 tabletkę zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego.
- Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pyralgina:

- jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol, inne pochodne pirazolonu i pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta występuje zespół astmy analgetycznej lub znana nietolerancja na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym (obrzękiem w obrębie języka, twarzy, warg i (lub) gardła) , tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nie opioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ),
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po zastosowaniu leków obniżających odporność organizmu) lub zmiany w obrazie morfologicznym krwi, takie jak zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych (leukopenia) lub pewnego rodzaju krwinek białych

granulocytów (agranulocytoza), lub niedokrwistość;

- jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobową;
- jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);
- jeśli pacjent stosuje lek z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np.fenylobutazon, propyfenazon);
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Działania niepożądane

Niezbędnie często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- wysypka polekowa (przemijająca wysypka),
- nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- leukopenia (spadek liczby białych krwinek),
- zmiany skórne (grudkowo-plamkowe).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- małopłytkowość (krwawienia, krwiaki),
- astma analgetyczna, napady astmy,
- ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek,
- białkomocz, skąpomocz, bezmocz.

Częstość nieznana:

- bóle i zawroty głowy,
- wymioty, nudności, biegunka, podrażnienie żołądka, bóle brzucha,
- czerwone zabarwienie moczu (po wysokich dawkach metamizolu),
- uszkodzenie wątroby.

Ostrzeżenia

- Lek Pyralgina zawiera sól.
- Zastosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku: chorób serca, zaburzeń krążenia, wysokiej gorączki, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, chorób uczuleniowych (pokrzywka, atopowe), nietolerancji niektórych barwników (tartrazyna) lub konserwantów (benzoesany).
- Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia: agranulocytozy, małopłytkowości, pancytopenii, ciężkiej choroby alergicznej.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Producent

POLPHARMA OTC
Pełplińska 19

Starogard Gdański

Galeria

