


# Radirex MAX, 10 kapsułek

Cena: 16,20 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                                 |
| Marka           | RADIRE                                                   |
| Opakowanie      | 10 kapsułek                                              |
| Postać          | Kapsułka                                                 |
| Producent       | WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE<br>"HERBAPOL" S.A.          |
| Przeznaczenie   | Zaparcia                                                 |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                          |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów,<br>Od 12 lat |

## Opis produktu

### Opis

**Radirex MAX** to produkt leczniczy o działaniu przeczyszczającym, przeznaczony do stosowania w przypadku sporadycznych zaparć. Jego działanie opiera się na obecności pochodnych antracenowych, takich jak reina, które wykazują działanie przeczyszczające. Produktem tym można się posłużyć w celu złagodzenia okresowych problemów z zaparciami.

### Wskazania

Do krótkotrwałego stosowania na sporadycznie występujące zaparcia.

### Działanie

Przeczyszczające.

### Dawkowanie

Stosować doustnie. Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku 12 lat: 2 kapsułki na dobę, wieczorem. Stosować po jedzeniu, popijając wodą. Zazwyczaj wystarczy stosowanie leku od dwóch do trzech razy w tygodniu. Stosowanie leku dłużej niż dwa tygodnie wymaga konsultacji z lekarzem.

### Skład

1 kapsułka twarda zawiera 196,9 mg - 371,2 mg wyciągu suchego z *Rheum palmatum* L. i/lub *Rheum officinale* Baillon, radix (korzeń rzewienia), co odpowiada 15 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę. Ekstrahent: etanol 70 % V/V. Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 3,8 mg - 178,1 mg. Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, wapnia węglan, krospowidon typ A, magnezu stearynian, kapsułka żelatynowa twarda z nadrukiem ( kapsułka: żelaza tlenek czarny, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty, żelatyna; tusz: szelak, glikol propylenowy, stężony roztwór amoniaku, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny).

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Radirex MAX:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną leku lub na którykolwiek z pozostałych jego składników,
- w przypadku obecnej niedrożności/atonii/zwężenia jelit, zapaleniu wyrostka robaczkowego, chorób zapalnych jelit (np. WZJG - wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroby Crohna),
- w przypadku bólu brzucha o nieznanej etiologii, w ciężkim odwodnieniu (z dużą utratą elektrolitów i dowy),
- u osób poniżej 12 lat.

#### Ostrzeżenia

Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne, leki wydłużające odstępn Q-T, leki moczopędne, kortykosteroidy, korzeń lukrecji powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.

- Podobnie jak w przypadku innych leków przeczyszczających, jeśli nie zostało to zalecone przez lekarza, Radirex MAX nie powinien być przyjmowany przez pacjentów cierpiących na kamienie żółciowe oraz ostre lub przewlekłe dolegliwości żołądkowo-jelitowe o niewyjaśnionej przyczynie tj. ból brzucha, nudności, wymioty, ponieważ takie objawy mogą być oznaką możliwej lub istniejącej niedrożności jelit.
- Należy unikać długotrwałego stosowania leków przeczyszczających. Długotrwałe stosowanie leków przeczyszczających pobudzających perystaltykę jelit, może prowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia od leków przeczyszczających. Leki zawierające wyciąg z rzewienia powinny być podawane tylko wówczas jeśli efektu leczniczego nie można osiągnąć poprzez zmianę diety lub stosowanie środków pęczniących.
- Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni mieć świadomość możliwych zaburzeń elektrolitowych.
- Radirex MAX zawiera laktozę - należy wziąć to pod uwagę w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.