

Radirex Plus, syrop, 125 g



Cena: 27,25 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	125 g
Postać	Syrop
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Przeczyszczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Radirex Plus to syrop roślinny o działaniu przeczyszczającym, tradycyjnie stosowany w przypadku zaparć u młodzieży powyżej 12. roku życia oraz dorosłych.

Wskazania

Lek stosuje się w zaparciach.

Działanie

Lek działa przeczyszczająco. Nasila ruchy jelit i wpływa na uwodnienie mas kałowych.

Dawkowanie

- Młodzież powyżej 12 lat: 10-15 ml miarką lub 2 do 3 łyżeczek do herbaty, tj. od 8,5 do 12,7 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.
- Dorośli: 30 ml miarką lub 2 łyżki stołowe, tj. 25,4 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Skład

- 100 g produktu leczniczego zawiera 10 g extractum fluidum (1:1) compositum ex: korzenia rzewienia (Rhei radice), kory kruszyny (Frangulae cortice), owocu kopru (Foeniculi fructu), owocu kminku (Carvi fructu).

Ekstrahent - etanol 50% (v/v)

Zawartość etanolu do 3,5% (m/m)

- Substancje pomocnicze: sacharoza, woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek składnik preparatu oraz u pacjentów z niedrożnością jelit, atonią jelit, ostrymi i przewlekłymi chorobami zapalnymi jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), zapaleniem wyrostka robaczkowego, biegunką, odwodnieniem i zaburzeniami elektrolitowymi, bólem brzucha o niejasnej etiologii.

Działania niepożądane

- Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000): reakcje nadwrażliwości.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ból brzucha, stany skurczowe jelit, płynny stolec (szczególnie u pacjentów z nadwrażliwym jelitem grubym).
- Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, białkomoczu i krwimoczu, pigmentację śluzówki jelita (pseudomelanosis coli), która zwykle przemija po zakończeniu przyjmowania leku.

Ostrzeżenia

- Należy unikać stosowania produktu leczniczego podczas miesiączki z uwagi na zawartość antrazwiazków mogących powodować przekrwienie macicy, a tym samym nasilać krwawienia menstruacyjne.
- Lek zawiera etanol
- Lek zawiera sacharozę - istotne dla diabetyków i chorych z nietolerancją niektórych cukrów.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Producent

HERBAPOL WROCLAW
Świętego Mikołaja 65/68
Wrocław