

Ranigast SOS, 12 tabletek do ssania

Cena: 13,74 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	RANIGAST
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletki do ssania
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ranigast S-O-S jest zalecany do łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga i ból w nadbrzuszu. Preparat pomaga zneutralizować kwas żołądkowy, zapobiegając uczuciu pieczenia, bólowi w nadbrzuszu i niestrawności, niezależnie od pierwotnej przyczyny dolegliwości. Można go również stosować wspomagająco w przypadku zapalenia żołądka. Zawiera kombinację substancji działających synergistycznie: alginian sodu, kwas alginowy i wodorowęglan, co zapewnia szybkie działanie. Alginiany, pochodzące z niektórych gatunków alg morskich, reagują z kwaśnym środowiskiem żołądka, szybko tworząc żel. Powstały żel tworzy ochronną warstwę na błonie śluzowej żołądka. Wodorowęglan i węglan neutralizują kwas żołądkowy, a pęcherzyki dwutlenku węgla, powstałe w reakcji z kwasem solnym, zostają uwieszone w żelu alginianowym. Przekształca się on w piankę unoszącą się na powierzchni soku żołądkowego, tworząc barierę zmniejszającą liczbę epizodów refluksu.

Składniki

1 tabletkę zawiera:

- alginian sodu 200mg, kwas alginowy 50mg, wodorowęglan sodu 80mg, węglan wapnia 140mg,
- substancje pomocnicze: mannitol, sukraloza, dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, behenian glicerolu, aromaty: wyciąg z imbiru, olejek eteryczny z imbiru, cytryna, mięta.

Zastosowanie

Łagodzenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego takich jak: zgaga oraz ból w nadbrzuszu.

Sposób użycia

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: zaleca się przyjmować 2 tabletki po głównym posiłku, w razie potrzeby popijając wodą.
- Dzieci (6-12 lat): zaleca się przyjmować 1 tabletkę po głównym posiłku, w razie potrzeby popijając wodą.



Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku przewlekłych zaparć lub biegunki, choroby nerek lub przewlekłej niewydolności serca.

Ostrzeżenia

- Wyrób medyczny zasadniczo przeznaczony jest do stosowania u dorosłych po ukończeniu 18. roku życia.
- Wyrób medyczny może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- Nie przekraczać zalecanej dawki, ponieważ większe ilości mogą doprowadzić do zaparcia lub przemijającej biegunki.
- Produkt nie powinien być stosowany dłużej niż przez 30 dni.

Ważne wskazówki

- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

SIIT
Via Ariosto 50/60
Trezzano sul Naviglio - Milano, Włochy