

# Raphacholin forte, 10 tabletek

Cena: 17,47 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	RAPHACHOLIN
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Niestrawność, Trawienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Raphacholin Forte** to lek dostępny w postaci tabletek, który jest stosowany w przypadku niedostatecznego wydzielania żółci przez wątrobę oraz przy występowaniu niestrawności. Objawy niestrawności mogą obejmować bóle brzucha, wzdęcia, odbijanie, zaparcia i nudności. Ten lek zawiera kwas dehydrocholowy w połączeniu z wyciągiem z czarnej rzodkwi. Działanie Raphacholin Forte polega na zwiększaniu ilości wydzielanej żółci (działanie żółciopędne) oraz przyspieszaniu jej transportu do dwunastnicy. Zwiększone ilości żółci stymulują pracę jelita grubego i wykazują działanie osmotyczne, co nadaje temu produktowi łagodne właściwości przeczyszczające. Warto zaznaczyć, że Raphacholin Forte jest lekiem i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z instrukcjami zawartymi na opakowaniu.

### Wskazania

- niedostateczne wydzielanie żółci,
- niestrawność z objawami odbijania, nudności, wzdęcia, bólu brzucha,
- łagodne zaparcia (łagodny środek przeczyszczający).

### Działanie

Żółciotwórcze, żółciopędne, przeczyszczające.

### Dawkowanie

- Dorośli, w przypadku niestrawności: 1 tabletkę po posiłku, dawkę można zwiększyć do 3 tabletek na dobę.
- Dorośli, w przypadku zaparcia: 2 tabletki jednorazowo. Spodziewany efekt przeczyszczający do 6 godzin.

### Skład

1 tabletkę powlekana zawiera:

- 250 mg kwasu dehydrocholowego,

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Raphacholin Forte:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występują: przewlekłe i ostre schorzenia wątroby, ostre stany zapalne w obrębie przewodu pokarmowego, niedrożność dróg żółciowych i przewodu pokarmowego.

#### Działania niepożądane

- nudności, wymioty, biegunka,
- inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego,
- reakcje alergiczne.

#### Ostrzeżenia

- W przypadku kamicy żółciowej lub przewodowej stosowanie leku wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować leku dłużej niż tydzień w przypadku zapać.
- Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.
- Lek zawiera jako substancję pomocniczą olejek eteryczny miętowy, który może wywoływać reakcje alergiczne.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

#### Producent

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA  
ul. św. Mikołaja 65/68  
50-951 Wrocław