

Remo-Wax spray, aerozol do usuwania woskowiny usznej, 10 ml



Cena: 22,95 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ml
Postać	spray do uszu
Producent	ORION PHARMA POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Korek woskowinowy
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Remo-wax spray do uszu wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w przypadku korków woskowinowych oraz rozpuszczania woskowiny. Zawierają naturalne i bezpieczne składniki, takie jak alantoina i lanolina.

Wskazania

Aerozol do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax rozpuszcza korek woskowinowy i zapobiega jego powstawaniu.

Skład

Alantoina, lanolina etoksylogowana, polisorbata 80, polisorbata 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-stearylowy, eter polioksyetyleno-oleilowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z tłuszczu nerek, alkohol fenyletylowy, alkohol cetylowy, butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetonowy, woda.

Sposób użycia

Rozpuszczanie korka woskowinowego przy użyciu kropli do uszu:

- Ogrzać zawartość butelki Remo-Wax do temperatury ciała (około 37°C) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.
- W przypadku użycia aerozolu po raz pierwszy, w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia preparatu należy 3-5 razy rozpylić aerozol w powietrze lub w chusteczkę. Nie należy uwalniać aerozolu w swoim kierunku. Jeżeli preparat nie jest używany przez jakiś czas, należy upewnić się, że jest on prawidłowo rozpylany poprzez 1-2 krotne uciśnięcie rozpylacza.
- Delikatnie pociągnąć górną część ucha do góry i do tyłu. Trzymając butelkę w pozycji pionowej, wprowadzić końcówkę dyszy do ujścia przewodu słuchowego. Należy rozpylić 2 do 3 razy preparat Remo-Wax spray do przewodu słuchowego. Pociągnąć delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy. Można wprowadzić do ucha mały wacik z bawełny zwilżony preparatem Remo-Wax spray.
- Pozostawić Remo-Wax w uchu przez 20 do 60 minut. W razie potrzeby można pozostawić roztwór w uchu na noc.

- Po zastosowaniu należy zdjąć końcówkę dyszy, umyć ją wodą z mydłem, dokładnie wypłukać, osuszyć i ponownie umieścić na miejscu. Nigdy nie wolno używać aerozolu bez założonej końcówki dyszy!
- Po użyciu kropli do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax przewód słuchowy musi zostać przepłukany. W celu przepłukania uszu można użyć gruszki gumowej Remo-Wax lub udać się do lekarza lub pielęgniarki.

Płukanie ucha przy użyciu gumowej gruszki:

- Gruszkę należy umyć i przepłukać przed każdym użyciem.
- Nabrać do gruszki wody o temperaturze ciała.
- Wsunąć ostrożnie końcówkę gruszki do kanału słuchowego na głębokość kilku milimetrów i płukać ucho, delikatnie i bez pośpiechu ściskając gruszkę.
- Nie należy wprowadzać końcówki gruszki w głąb przewodu słuchowego!
- Powtórzyć płukanie kilka razy, aż woda wypływająca z ucha będzie zupełnie czysta.
- Po zakończonym zabiegu gruszkę należy umyć i wycisnąć do pusta w celu usunięcia zawartości. Należy pozostawić gruszkę, kierując końcówkę gruszki do dołu, tak aby znajdująca się w niej woda mogła wypłynąć. Jeśli nie udało się rozpuścić korka woskowinowego, podawanie kropli i płukanie uszu można powtarzać przez kolejne trzy dni.
- Stosując Remo-Wax regularnie raz w miesiącu można uniknąć ponownego powstania korka woskowinowego. Uwaga! Należy przepłukać ucho po każdym zabiegu.
- Jeśli pacjent ma zamiar odwiedzić lekarza lub pielęgniarkę w celu wykonania płukania ucha, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.
- Uwaga: Płukanie ucha nie powinno powodować bólu. Jeśli pacjent odczuwa ból, należy przerwać płukanie ucha i skontaktować się z lekarzem.
- W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem kropli Remo-Wax należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.
- Zaleca się by płukanie uszu u dzieci było wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania preparatu:

- stan zapalny lub ból ucha,
- wydzielina z ucha,
- uszkodzona, przedziurawiona lub przebita błona bębenkowa (np. dren po nakłuciu błony bębenkowej),
- uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników aerozolu Remo-Wax spray.

Uwagi

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent

ORION CORPORATION/ORION OYJ
Orionintie 1
FL-02200 Espoo, Finlandia