

Rennie Antacidum, 680 mg+80 mg, tabletki do ssania, smak miętowy, 24 sztuki

Cena: 23,07 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	RENNIE
Opakowanie	24 tabletki
Postać	Tabletki do ssania
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zobojętniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Rennie Antacidum to lek stosowany w przypadku zgagi, niestrawności i odbijania, czyli dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego. Lek neutralizuje nadmiar kwasu solnego w żołądku i jest dostępny w miętowym smaku.

Wskazania

Leczenie objawowe dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak:

- zgaga,
- niestrawność,
- wzdęcia,
- nudności,
- odbijanie,
- uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu.

Działanie

Rennie Antacidum zawiera substancje czynne (węglan wapnia, węglan magnezu) odpowiedzialne za zobojętnienie nadmiaru kwasu solnego w żołądku (czego efektem jest zwiększenie pH). Lek działa miejscowo i nie wchłania się do krwioobiegu.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1-2 tabletki, godzinę po posiłku i przed snem. Nie stosować więcej niż 11 tabletek na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi są: węglan wapnia, magnezu węglan ciężki

- 1 tabletkę zawiera 680 mg węgla wapnia i 80 mg magnezu węgla ciężkiego.
- Substancje pomocnicze: sacharoza, żelowana skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, parafina ciekła lekka, aromat miętowy (olejek miętowy, maltodekstryna, guma arabska, ditlenek krzemu), aromat cytrynowy (olejek cytrynowy, maltodekstryna, woda).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rennie Antacidum:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku stwierdzonego zwiększonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia),
- jeśli stwierdzono u pacjenta wapniową kamicę nerkową, ciężką niewydolność nerek,
- w przypadku obniżonego stężenia fosforanów nieorganicznych we krwi (hipofosfatemia).

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- nudności, wymioty, biegunka,
- dyskomfort w żołądku,
- osłabienie mięśni,
- reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy).

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie może wiązać się z hipermagnezemią, hiperkalcemią, zasadowicą.
- Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów: ze stwierdzoną niewydolnością nerek, z nadmiernym wydalaniem wapnia z moczem (hiperkalcuria).
- Chorzy na cukrzycę powinni wziąć pod uwagę zawartość sacharozy - 1 tabletkę zawiera 475 mg sacharozy.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

BAYER SP. Z O.O.
Aleje Jerozolimskie 158
Warszawa
info-consumerhealth.pl@bayer.com

Galeria

