

Rennie Antacidum, 680 mg+80 mg, tabletki do ssania, smak miętowy, 48 tabletek



Cena: 22,25 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	48 tabletek
Postać	Tabletki do ssania
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zobojętniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Rennie Antacidum to środek leczniczy przeznaczony do łagodzenia objawów takich jak zgaga, niestrawność czy odbijanie, które wynikają z nadmiernej kwasowości soku żołądkowego. Działa poprzez neutralizację nadmiaru kwasu solnego w żołądku. Produkt dostępny jest w wersji o miętowym smaku.

Wskazania

Leczenie objawowe dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak:

- zgaga,
- niestrawność,
- wzdęcia,
- nudności,
- odbijanie,
- uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu.

Działanie

Rennie Antacidum zawiera substancje czynne (węglan wapnia, węglan magnezu) odpowiedzialne za zobojętnienie nadmiaru kwasu solnego w żołądku (czego efektem jest zwiększenie pH). Lek działa miejscowo i nie wchłania się do krwioobiegu.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1-2 tabletki, godzinę po posiłku i przed snem Nie stosować więcej niż 11 tabletek na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi są: węglan wapnia, magnezu węglan ciężki



- 1 tabletkę zawiera 680 mg węglanu wapnia i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego.
- Substancje pomocnicze: sacharoza, żelowana skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, parafina ciekła lekka, aromat miętowy (olejek miętowy, maltodekstryna, guma arabska, ditlenek krzemu), aromat cytrynowy (olejek cytrynowy, maltodekstryna, woda).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rennie Antacidum:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku stwierdzonego zwiększonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia),
- jeśli stwierdzono u pacjenta wapniową kamicę nerkową, ciężką niewydolność nerek,
- w przypadku obniżonego stężenia fosforanów nieorganicznych we krwi (hipofosfatemia).

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie może wiązać się z hipermagnezemią, hiperkalcemią, zasadowicą.
- Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów: ze stwierdzoną niewydolnością nerek, z nadmiernym wydalaniem wapnia z moczem (hiperkalcuria).
- Chorzy na cukrzycę powinni wziąć pod uwagę zawartość sacharozy - 1 tabletkę zawiera 475 mg sacharozy.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

BAYER SP. Z O.O.
Aleje Jerozolimskie 158
Warszawa