

Reparil 20 mg, 40 tabletek dojelitowych (import równoległy Pharmapoint)

Cena: 19,40 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	40 tabletek
Postać	Tabletki dojelitowe
Producent	PHARMAPOINT S.A.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Przeciwwysiękowe, Uszczelniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 7 lat

Opis produktu

Opis

Reparil to produkt leczniczy przeznaczony do leczenia obrzęków po miejscowych urazach.

Wskazania

Obrzęki będące wynikiem miejscowego urazu.

Działanie

Escyna działa w obrębie ściany naczynia, hamuje wysięk, przyspiesza zmniejszanie się obrzęku. Dodatkowo escyna wzmacnia odporność naczyń włosowatych, poprawia mikrokrążenie, hamuje procesy zapalne.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież od 14 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę.
- Dorośli i młodzież od 14 lat (dawka podtrzymująca lub lekkie przypadki): 1 tabletka 3 razy na dobę.
- Dzieci od 7 do 14 lat: 1 tabletka 2-3 razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną jest: escyna (Escinum).
- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian; skład otoczki: sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudragit L 100-55), makrogol 8000, sodu wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, symetykon emulsja, wosk biały, wosk Carnauba



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Reparil:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na escynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność lub zaburzenia nerek,
- u dzieci w wieku poniżej 7 lat,
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości np. pokrzywka.

Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, lek Reparil należy odstawić.
- Reparil zawiera laktozę jednowodną i sacharozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Domaniewska 39A
02-672 Warszawa