

Reparil, 20 mg, tabletki dojelitowe, 40 tabletek

Cena: 26,26 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	40 tabletek
Postać	Tabletki dojelitowe
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Przeciwwysiękowe, Uszczelniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 7 lat

Opis produktu

Opis

Reparil to produkt leczniczy przeznaczony do leczenia obrzęków po miejscowych urazach.

Wskazania

Obrzęki będące wynikiem miejscowego urazu.

Działanie

Escyna działa w obrębie ściany naczynia, hamuje wysięk, przyspiesza zmniejszanie się obrzęku. Dodatkowo escyna wzmacnia odporność naczyń włosowatych, poprawia mikrokrążenie, hamuje procesy zapalne.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież od 14 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę.
- Dorośli i młodzież od 14 lat (dawka podtrzymująca lub lekkie przypadki): 1 tabletka 3 razy na dobę.
- Dzieci od 7 do 14 lat: 1 tabletka 2-3 razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną jest: escyna (Escinum)
- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian; skład otoczki: sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudragit L 100-55), makrogol 8000, sodu wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, symetykon emulsja, воск biały, воск Carnauba

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Reparil:



- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na escynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność lub zaburzenia nerek,
- u dzieci w wieku poniżej 7 lat,
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości np. pokrzywka.

Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, lek Reparil należy odstawić.
- Reparil zawiera laktozę jednowodną i sacharozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Domaniewska 39A
02-672 Warszawa