

Respero Myrtol 300 mg, 50 kapsułek

Cena: 80,45 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	RESPERO MYRTOL
Opakowanie	50 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	G.POHL-BOSKAMP GMBH & CO.KG
Przeznaczenie	Przeciwzapalne, Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 10 lat

Opis produktu

Opis

Respero Myrtol 300 mg to lek roślinny w formie miękkich kapsułek dojelitowych, odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia. Jego substancją czynną jest destylat z mieszaniny rektyfikowanych olejków eterycznych: eukaliptusowego, pomarańczy słodkiej, mirtu zwyczajnego i cytryny zwyczajnej. Respero Myrtol pomaga rozluźnić śluz, ułatwia jego oczyszczanie, co prowadzi do łatwiejszego odkrztuszania i zmniejszenia stanu zapalnego górnych dróg oddechowych.

Wskazania

Lek Respero Myrtol jest przeznaczony do stosowania w:

- łagodzeniu objawów ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych.

Działanie

Rozluźniające śluz i ułatwiające oczyszczanie ze śluzu górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 roku życia: 1 kapsułek 3-4 razy na dobę.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancja czynna: destylat z mieszaniny rektyfikowanych olejków eterycznych 300 mg: Eucalyptus globulus Labill. aetheroleum (eukaliptusowy olejek eteryczny), Citrus sinensis L. aetheroleum (pomarańczy słodkiej olejek eteryczny), Myrtus communis L. aetheroleum (mirtu zwyczajnego olejek eteryczny) i Citrus limon L. aetheroleum (cytryny zwyczajnej olejek eteryczny),
- pozostałe składniki to: olej rzepakowy, rafinowany, żelatyna, glicerol 85% (E 422), hypromelozy octano-bursztynian, trietylu cytrynian, sorbitol ciekły, niekryształujący (E 420), kwas solny (13%), sodu laurylosiarczan, talk, dekstryna, amonowy

glicyryzynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne, lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Gdy u pacjenta występują stany zapalne żołądka, jelit lub dróg żółciowych, lub jeśli pacjent cierpi z powodu ciężkiej choroby wątroby.

Działania niepożądane

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

- dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. ból brzucha/uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu,
- rzadkie przypadki nudności, wymiotów lub biegunki.

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- reakcje nadwrażliwości (np. wysypka skórna, świąd, obrzęk twarzy, duszność lub zaburzenia krążenia krwi).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

- kamienie obecne w nerkach lub drogach żółciowych mogą ulec przemieszczeniu.

Ostrzeżenia

- Gdy objawy choroby utrzymują się lub ulegną pogorszeniu, lub jeśli wystąpi duszność, lub gorączka, lub jeśli pacjent rozpocznie odkrztuszanie śluzu zawierającego krew, lub wydzielinę ropną, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Pacjenci, którzy chorują na astmę oskrzelową, koklusz lub inne schorzenia układu oddechowego, którym towarzyszy znaczna nadwrażliwość układu oddechowego, powinni przyjmować Respero Myrtol wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Producent

BERLIN-CHEMIE