

Revicord Muco, spray, do jamy ustnej i gardła, 30 ml



Cena: 28,26 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 ml
Postać	Aerozol
Producent	ACCORD HEALTHCARE LTD.
Przeznaczenie	Antyoksydacyjne, Łagodzące, Nawilżające, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Simecol Forte to wyrób medyczny w formie sprayu, przeznaczony dla dorosłych. Preparat jest stosowany w przypadku stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Wskazania

Revicord Muco Spray stosowany jest wspierająco w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, które mogą występować w czasie stosowania chemio- i/lub radioterapii oraz w stanach zapalnych gardła, migdałków lub krtani.

Działanie

- Revicord Muco Spray tworzy barierę ochronną na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła.
- Pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu, przez co wspiera regenerację błony śluzowej jamy ustnej.
- Moduluje procesy naprawy uszkodzeń popromiennych, poprzez przyspieszanie gojenia obszaru owrzodzeń.
- Hialuronian sodu, aloes, propolis oraz aminokwasy mają właściwości nawilżające i kojące, dzięki którym przyczyniają się do redukcji uczucia zmniejszenia bólu, pieczenia i suchości w jamie ustnej.
- Aminokwasy wspierają proces regeneracji uszkodzonej błony śluzowej.
- Witamina E oraz cynk wykazują właściwości antyoksydacyjne.
- Rumianek ma właściwości antyseptyczne i łagodzące.

Skład

Hialuronian sodu; L-prolina; L-leucyna; L-lizyna; glicyna; witamina E; substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K; Aloe vera żel; destylowana woda z rumianku; ekstrakt z propolisu; glukonian cynku; aromat miętowy; polisorbát 20; kwas cytrynowy; substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu; woda q.s. 100%.

Sposób użycia

- Przed zastosowaniem preparatu dokładnie wypłukać jamę ustną wodą.



- Wstrząsnąć butelkę, a następnie obrócić tak, aby rozpylacz znajdował się u góry.
- Zdjąć nasadkę z rozpylacza.
- Obrócić końcówkę rozpylacza pod kątem 45-90o.
- Umieścić końcówkę w jamie ustnej, a następnie rozpylić 2-3 razy naciskając nasadkę.
- W ciągu godziny od zastosowania nie należy spożywać posiłków i napojów oraz płukać jamy ustnej.
- Preparat należy stosować aż do ustąpienia objawów, przez 3–4 tygodnie. Stosowanie powyżej 30 dni należy skonsultować z lekarzem.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- W przypadku nietolerancji lub wystąpienia innych działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią, przed zastosowaniem wyrobu powinny skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować po upływie daty ważności.
- Nie stosować jeżeli uszkodzone jest opakowanie.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie ekspozować na działanie gorąca i promieni słonecznych
- Jeżeli preparat jest przechowywany zgodnie z opisanymi poniżej zasadami, może być stosowany w ciągu 12 miesięcy od otwarcia.

Producent

EKUBERG PHARMA S.U.R.L.