

Robitussin Junior, 3,75 mg/5 ml, syrop, 100 ml



Cena: 10,59 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	100 ml
Postać	Syrop
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Robitussin Junior to syrop przeciwkaszlowy przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Zawiera dekstrometorfan, substancję czynną, która działa na ośrodek kaszlu w mózgu, skutecznie tłumiąc suchy i uporczywy kaszel.

Wskazania

Robitussin Junior przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

Działanie

Robitussin Junior zawiera dekstrometorfan, będący nieopiodowym lekiem przeciwkaszlowym.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 20 ml (15 mg dekstrometofanu) 4 razy na dobę (maksymalna dawka dobową dekstrometofanu 60 mg).
- Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 10 ml (7,5 mg dekstrometofanu) 4 razy na dobę (maksymalna dawka dobową dekstrometofanu 30 mg).

Skład

- Substancją czynną jest dekstrometofanu bromowodorek (Dextrometorphani hydrobromidum).

5 ml syropu zawiera 3,75 mg dekstrometofanu bromowodoru.

- Substancje pomocnicze: gliceryna, karboksymetyloceluloza sodowa, benzoesan sodu, wersenian disodowy, maltitol (E 965), etanol 96%, kwas cytrynowy bezwodny, amarant (E 123), karmel, lewomentol, zapach z wiśni i owoców granatu, sorbitol (roztwór 70%) (E 420), cyklaminian sodu, sól potasową acesulfamu, wodę oczyszczoną.



Przeciwwskazania

Syropu Robitussin Junior nie stosować u osób uczulonych na bromowoderek dekstrometofanu albo którykolwiek z pozostałych składników produktu. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest: kaszel z dużą ilością wydzieliny, astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa lub ryzyko wystąpienia jej, ciężka niewydolność wątroby. Nie stosować syropu u pacjentów przyjmujących: (szczególnie w ciągu ostatnich 14 dni) inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO), selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny (SSRI) lub inne leki podawane w leczeniu depresji, chorób psychicznych, zaburzeń nastroju czy Parkinsonie.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 pacjentów): nadwrażliwość, senność, zawroty głowy, nudności, wymioty.

Ostrzeżenia

Lek zawiera sorbitol i maltitol (likazynę 80/55). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego leku. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu (likazyny 80/55). Informacja dla cukrzyków: substancje słodzące zawarte w tym leku nie powinny wpłynąć na cukrzycę.

Producent

PFIZER CORP.AUSTRIA GMBH
Floridsdorfer Hauptstraße 1
Wiedeń, Austria