

Rostil Tabletki 30 sztuk

Cena: 15,42 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ROSTIL
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Hemoroidy, Obrzęk, Zakrzepy, Żylaki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lek **Rostil** zawiera aktywną substancję w postaci wapnia dobezylanu jednowodnego, który wykazuje działanie ochronne na naczynia krwionośne oraz zdolność do regulacji napięcia naczyń, prowadząc do zmniejszenia zastój krwi w układzie żylnym i poprawy szczelności naczyń limfatycznych.

Wskazania

Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki): ból, kurcze, mrowienie, obrzęk, zmiany skórne na tle zastój krwi.

Działanie

Lek Rostil działa na wiele sposobów, aby poprawić stan naczyń krwionośnych i limfatycznych. Substancja czynna wapnia dobezylanu jednowodny, zawarta w leku, wykazuje zdolność zmniejszania przepuszczalności naczyń włosowatych oraz zwiększania ich wytrzymałości, co skutecznie zapobiega tworzeniu się nadmiernych wysięków i poprawia mikrokrążenie. Ponadto, lek zwiększa napięcie ścian żył, co przeciwdziała powstawaniu zastój krwi i ryzyku zakrzepów w naczyniach żylnych.

Dodatkowo, Rostil nasila syntezę kolagenu, co przyczynia się do poprawy elastyczności i wytrzymałości naczyń. To również przyczynia się do zmniejszenia lepkości osocza, umożliwiając płynniejszy przepływ krwi przez tkanki obwodowe. Działanie uszczelniające na naczynia limfatyczne prowadzi do zmniejszenia obrzęków, co skutkuje ustąpieniem dolegliwości bólowych i uczucia ciężkości w kończynach. Ogólnie rzecz biorąc, Rostil działa kompleksowo, mając na celu poprawę funkcjonowania naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz złagodzenie związanych z nimi dolegliwości.

Dawkowanie

Zalecana dawka: dorośli od 500mg (2 tabletki) do 1000mg (4 tabletki) na dobę, tj. 2 tabletki 1-2 razy na dobę. Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Skład

1 tabletki zawiera: substancję czynną: 250mg wapnia dobezylanu jednowodnego oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna,

skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, krospowidon.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

