

Rutinoscorbin, tabletki powlekane, 150 tabletek

Cena: 32,48 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	RUTINOSCORBIN
Opakowanie	150 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Grypa, Infekcja, Niedobór witamin, Obniżona odporność, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis
Rutinoscorbin to produkt leczniczy stosowany w stanach przeziębienia oraz zakażenia wirusowego w tym grypie.

Wskazania
Rutinoscorbin stosuje się w stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C oraz pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń.

Działanie

- Rutozyd działa wzmacniająco na naczynia krwionośne i zmniejsza ich przepuszczalność. Chroni także witaminę C przed utlenieniem, dzięki czemu zachowuje ona dłużej swoje właściwości.
- Witamina C działa przeciwutleniająco. Jest niezbędna w wielu procesach metabolicznych, uczestniczy m.in. w tworzeniu kolagenu i hemoglobiny oraz ułatwia przyswajanie żelaza.

Dawkowanie

- Profilaktycznie: od 1 do 2 tabletek na dobę.
- W stanach niedoboru witaminy C: od 1 do 2 tabletek od 2 do 4 razy na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są rutozyd (Rutosidum) i kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).
- 1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu i 100 mg kwasu askorbowego.



- Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki laktoza jednowodna, skroia ziemniaczana, sacharoza, magnezu stearynian, talk, alkohol poliwinylowy, skład otoczki: opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytany dwutlenek (E171), talk, żółcień chinolinowa (E104).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rutinoscorbin:

- jeśli pacjent ma uczulenie na rutozyd oraz kwas askorbowy (witaminę C) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

kamicę szczawianową lub miał ją w przeszłości,

- choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza lub inne choroby mogące powodować nadmiar żelaza w organizmie.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 pacjentów):

- reakcje alergiczne, w tym reakcje nadwrażliwości (skrócenie oddechu, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, wysypka skórna, świąd),
- bóle głowy, zawroty głowy,
- wymioty, nudności, biegunka, niestawność, ból brzucha,
- zmęczenie.

Częstość nieznana:

- zaczerwienienie skóry,
- zwiększone oddawanie moczu, kamica nerkowa.

Ostrzeżenia


- Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
- Rutinoscorbin zawiera laktozę jednowodną i sacharozę, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
- Rutinoscorbin zawiera żółcień chinolinową, dlatego może powodować reakcje alergiczne.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić z lekarzem jeśli pacjent ma rzadką chorobę metaboliczną, bądź zaburzenia czynności nerek oraz jeśli pacjent stosuje sulfonamidy.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
Grunwaldzka 189
Poznań

Galeria

Rutinoscorbin



Rutinoscorbin zawiera **rutozyd**, który **zwiększa wchłanianie witaminy C**.

Rutinoscorbin

KIEDY CZUJESZ SIĘ NIEWYRAŹNIE



i każdego dnia dla wsparcia odporności

Rutinoscorbin

PRZED CHOROBA



Profilaktycznie przed i w trakcie sezonu przeziębieniowego dla obrony przed infekcjami

Rutinoscorbin

W TRAKCIE CHOROBY



Przy pierwszych objawach choroby, by wspomóc leczenie

Rutinoscorbin

PO CHOROBY*




Po przebytej chorobie w celu uzupełnienia niedoboru witaminy C i odbudowy odporności

Rutinoscorbin



Może być stosowany w stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (**przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa**).

Rutinoscorbin



Może być stosowany pomocniczo przy nadmiernej **przepuszczalności naczyń krwionośnych**.