

# Sachol żel 10 g

Cena: 26,66 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	10 g (tub.)
Postać	żel do stos. w j.ust.
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.



## Opis produktu

### Opis

**Sachol** to lek w formie żelu przeznaczony do miejscowego stosowania w jamie ustnej i na dziąsła. Jest stosowany w przypadku stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, zapalenia dziąseł, nadżerek jamy ustnej, aft oraz owrzodzeń jamy ustnej, chorób przyzębia i parodontozy. Lek ten jest dostępny bez recepty.

Żel stomatologiczny Sachol® wykazuje lokalne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i odkażające. Zawarte w nim składniki, takie jak salicylan choliny, chlorek cetalkoniowy, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, odpowiadają za te właściwości.

Salicylan choliny działa miejscowo przeciwzapalnie i słabo przeciwbólowo. Chlorek cetalkoniowy wzmacnia działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne żelu. Natomiast parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu mają działanie odkażające.

### Wskazania

Żel stomatologiczny wskazany do miejscowego stosowania:

- w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej,
- w nadżerkach i owrzodzeniach jamy ustnej,
- w stanach zapalnych dziąseł,
- w chorobach przyzębia.

### Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i odkażające miejscowo.

### Skład

1 g żelu zawiera:

- substancje czynne: choliny salicylan (Cholini salicylas) 87,1 mg, cetalkoniowy chlorek (Cetalkonii chloridum) 0,1 mg,
- substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan,

- pozostałe substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, glicerol, olejek eteryczny anyżu gwiazdzistego, etanol 96%, woda oczyszczona.

#### Ostrzeżenia

Przed pierwszym zastosowaniem leku Sachol® zaleca się skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. To pozwoli uzyskać odpowiednie wskazówki dotyczące jego stosowania i dawkowania, zwłaszcza jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości.

W miejscu zastosowania leku Sachol® może wystąpić krótkotrwałe i przemijające pieczenie. Jest to normalna reakcja i zazwyczaj nie wymaga zaprzestania stosowania leku. Jeśli jednak doświadczasz silnego dyskomfortu lub niepokojących objawów, powinieneś przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Należy pamiętać, że lek Sachol® zawiera metyl parahydroksybenzoesan oraz propyl parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne. Reakcje alergiczne mogą mieć charakter późny, co oznacza, że objawy mogą pojawić się po pewnym czasie od zastosowania leku. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek objawy alergiczne, takie jak wysypka, świąd, obrzęk lub trudności w oddychaniu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.