

Sanofi Loxon 2% Płyn na skórę 60 ml



Cena: 54,43 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LOXON
Opakowanie	60 ml
Postać	Płyn
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łysienie, Wypadanie włosów
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Loxon 2% to lek przeznaczony do leczenia łysienia typu androgenowego u kobiet i mężczyzn. Głównym składnikiem aktywnym jest minoksydyl, który ma zdolność odwracania lub hamowania miniaturyzacji mieszków włosowych. Ten lek silnie stymuluje namnażanie się komórek mieszków włosowych w fazie wzrostu, co przyczynia się do zahamowania wypadania włosów i pobudzenia porostu w łysieniu androgenowym.

Loxon 2% jest dostępny w postaci płynu do miejscowego stosowania na skórę głowy dotkniętą łysieniem androgenowym. Efekty w postaci zahamowania wypadania włosów mogą być widoczne już po drugim miesiącu regularnego stosowania, natomiast intensywniejszy porost włosów zazwyczaj zaczyna się po około 4 miesiącach leczenia preparatem Loxon 2%. Pełny efekt terapeutyczny zwykle osiąga się po około 12 miesiącach systematycznego stosowania.

Wskazania

Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet.

Działanie

- Pobudzenie porostu włosów w łysieniu typu androgenowego u kobiet i mężczyzn. Odwracanie lub zahamowanie miniaturyzacji mieszków włosowych i pobudzenie namnażania się komórek mieszków w fazie wzrostu u osób po 18. roku życia.
- Wyniki leczenia w znacznym stopniu są uzależnione od systematycznego stosowania leku i indywidualnych cech pacjenta.

Dawkowanie

Lek stosuje się dwa razy na dobę.

1 ml płynu należy rozprowadzić w miejscu łysienia i wmasować w skórę (najczęściej szczyt głowy i zakola czołowe).

Skład

1 ml płynu zawiera:

- substancję czynną: 20 mg minoksydylu
- substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona, kwas cytrynowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Loxon 2%:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze
- jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat lub powyżej 65 lat.

Działania niepożądane

- Reakcje skórne, takie jak: podrażnienie skóry i świąd,
- Nadmierne owłosienie (w tym pojawienie się zarostu na twarzy kobiet),
- Miejscowy rumień,
- Wysuszenie/tuszczenie się skóry głowy,
- Zwiększenie liczby traconych włosów.

Ostrzeżenia

- Lek Loxon 2% należy stosować wyłącznie na prawidłową, zdrową skórę głowy.
- Leku Loxon 2% nie należy stosować w czasie stosowania innych leków podawanych miejscowo.
- Na początku leczenia (zwykle 2 - 6 tygodni) wystąpić może wzmożona utrata włosów. Jeśli wzmożona utrata włosów utrzymuje się powyżej 2 tygodni, należy przerwać stosowanie leku Loxon 2% i skontaktować się z lekarzem.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa