

# Sanofi Mucosolvan Mini Syrop smak owoców leśnych 100 ml



Cena: 23,40 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MUCOSOLVAN
Opakowanie	100 ml
Postać	Syrop
Producent	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Mukolityczne, Ułatwiający oddychanie, Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

## Opis produktu

### Opis

**Mucosolvan Mini** to lek w formie syropu przeznaczony dla dzieci powyżej 1. roku życia. Głównym składnikiem czynnym jest ambroksol chlorowodorek, który pobudza produkcję śluzu w drogach oddechowych, ułatwiając wykrztuszanie i łagodząc kaszel.

Syrop Mucosolvan Mini jest zalecany w leczeniu zarówno ostrej, jak i przewlekłej choroby płuc oraz oskrzeli, które są związane z trudnościami w wydzielaniu i transportowaniu śluzu.

Produkt nie zawiera cukru ani alkoholu, co czyni go odpowiednim do stosowania również przez osoby dorosłe.

### Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

### Działanie

Ułatwianie odkrztuszania i łagodzenie kaszlu.

### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat: 20 ml 2 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6. do 12. lat: 10 ml 2-3 razy na dobę.
- Dzieci od 2. do 6. lat: 5 ml 3 razy na dobę.
- Dzieci od 1. roku do 2. lat: 5 ml 2 razy na dobę.

### Skład

5 ml syropu zawiera:

- substancja czynna: 15 mg chlorowodorek ambroksolu,

- substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, sorbitol ciekły niekryształujący, glicerol 85%, kwas benzoesowy, acesulfam potasowy, aromat owoców leśnych PHL 132195, aromat waniliowy 201629, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Mucosolvan Mini, jeśli pacjent ma nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

### Działania niepożądane

- Często: nudności, uczucie drętwienia w obrębie jamy ustnej języka i gardła (zmniejszenie czucia w jamie ustnej i gardle) zmiana w odczuwaniu smaku (zaburzenia smaku).
- Niezbyt często: biegunka, niestrawność, ból brzucha (ból w nadbrzuszu), suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty.
- Rzadko: reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywka.

### Ostrzeżenia

- Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub ciężką niewydolność wątroby, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku.
- Jeśli wystąpi wysypka (w tym zmiany na błonach śluzowych, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować leku przed snem.

### Producent

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.  
ul. Bonifraterska 17  
00-203 Warszawa

### Galeria

