

Saridon, 250 mg+150 mg+50 mg, tabletki, 10 tabletek

Cena: 11,87 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Saridon to lek wykazujący działanie przeciwbólowe i przeciwwgorączkowe, stosowany w przypadku różnego rodzaju dolegliwości bólowych, takich jak ból głowy, zębów czy bóle menstruacyjne, a także w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu.

Wskazania

- Ból różnego pochodzenia (ból głowy, ból zęba, ból miesiączkowy, ból pooperacyjny, ból reumatyczny),
- Ból i gorączka związane z przeziębieniem i grypą.

Działanie

Saridon wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwwgorączkowe.

Dawkowanie

- Dorośli: 1-2 tabletki.
- Młodzież w wieku 12-16 lat: 1 tabletką.

Skład

- Substancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum), propyfenazon (Propyphenazonum), kofeina (Coffeinum).
- 1 tabletką zawiera 250 mg paracetamolu, 150 mg propyfenazonu i 50 mg kofeiny.
- Substancje pomocnicze: hypromeloza, celuloza mikrokryształiczna, esma-spreng, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Saridon:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne - propyfenazon, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku,

- w przypadku nadwrażliwości na pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, aminofenazon, metamizol),
- w przypadku uczulenia na febylbutazon, kwas acetylosalicylowy,
- jeśli u pacjenta występują: wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, ostra porfiria wątrobowa,
- u osób poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza,
- nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha,
- niewydolność wątroby, zapalenie wątroby,
- zawroty głowy, senność,
- uszkodzenie nerek,
- skurcz oskrzeli, astma,
- wysypka, świąd, obrzęk alergiczny i naczynioruchowy, rumień.

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, podwyższenia stężenia aminotransferazy alaninowej ALT, a także do uszkodzenia nerek.
- Osoby z niewydolnością nerek powinny mieć dostosowaną dawkę leku przez lekarza.
- W przypadku wystąpienia wysypki, zaczerwienienia czy pęcherzy na skórze, stosowanie leku należy przerwać.
- Leku nie należy łączyć z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
- Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może wiązać się z wystąpieniem przewlekłego bólu głowy.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Producent

BAYER SP. Z O.O.
Aleje Jerozolimskie 158
Warszawa