

Scopolan compositum, 10 mg+250 mg, tabletki powlekane, 10 tabletek

Cena: 19,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SCOPOLAN
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Rozkurczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Scopolan Compositum to produkt leczniczy stosowany w przypadku bolesnych skurczów przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo-płciowego.

Wskazania

Scopolan compositum stosuje się w krótkotrwałym leczeniu dolegliwości bólowych o dużym nasileniu w stanach skurczowych:

- przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego),
- dróg żółciowych (np. kolka żółciowa),
- układu moczowo-płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie).

Działanie

Scopolan compositum jest lekiem złożonym. Butylobromek hioscyny działa rozkurczająco a metamizol sodowy przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Lek znosi skurcze mięśni gładkich w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego.

Dawkowanie

Zwykle stosowane dawka dla dorosłych to 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo.

Skład

- Substancjami czynnymi są butylobromek hioscyny (Hyoscini butylbromidum) oraz metamizol sodowy jednowodny (Metamizolum natrium monohydricum).

- 1 tabletka drażowana zawiera 10 mg butylobromku hioscyny i 250 mg metamizolu sodowego jednowodnego.
- Substancje pomocnicze: talk, guma arabska, żelatyna wieprzowa, glicerol, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 171).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Scopolan compositum:

- nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
- uczulenie na alkaloidy tropanowe i ich pochodne,
- zmiany w obrazie morfologicznym krwi,
- wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej,
- ostra porfiria wątrobową,
- ostra niewydolność nerek lub wątroby,
- jaskra z wąskim kątem przesączania,
- rozrost prostaty,
- niedrożność porażenna jelit,
- zaparcia atoniczne,
- zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka,
- zwężenie szyi pęcherza moczowego,
- tachykardia,
- nużliwość mięśni (myasthenia gravis),
- patologiczne poszerzenie jelita grubego.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

- rumień, pieczenie skóry, świąd, pokrzywka, obrzęk,
- suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcia,
- tachykardia, hipotensja.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- uszkodzenie nerek, anuria,
- zaburzenia widzenia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozplywna martwica naskórka,
- uszkodzenie czynności krwiotwórczej szpiku o podłożu alergicznym.

Nieznana częstość występowania działań niepożądanych:

- reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny,
- uszkodzenie wątroby.

Producent

HERBAPOL WROCLAW
Świętego Mikołaja 65/68
50-951 Wrocław
herbapol@herbapol.pl