

Scorbolamid EXTRA Hot, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 8 saszetek

Cena: 18,24 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SCORBOLAMID
Opakowanie	8 saszetek
Postać	granulki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Ból, Obniżona odporność, Zapalenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Scorbolamid EXTRA Hot to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, który dodatkowo wspomaga odporność.

Wskazania

Gorączka i objawy związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, wspomaganie odporności organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C i cynk oraz uszczelnianie naczyń włosowatych

Działanie

Lek Scorbolamid EXTRA Hot zawiera:

- Salicylamid - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
- Rutozyd – pobudza układ odpornościowy i wspiera organizm w walce z infekcją wirusową. Zwiększa wchłanianie witaminy C, a także przedłuża jej działanie.
- Kwas askorbowy (witamina C) - uzupełnia niedobór witaminy C, wspomaga organizm przy infekcjach wirusowych i bakteryjnych. Wpływa na procesy związane z odpornością.
- Cynk – uzupełnia niedobór cynku, wspomaga odporność organizmu.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: 1 saszетка 3 razy na dobę. Wysypać zawartość jednej saszетки leku Scorbolamid EXTRA Hot do pół szklanki ciepłej wody i dokładnie zamieszać. Wypić natychmiast zawiesinę powstałą po rozpuszczeniu granulatów. Uwaga: granulat nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu. Lek przyjmować po posiłku.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są salicylamid, kwas askorbowy, rutozyd i cynk.

Każda saszetka zawiera 300 mg salicylamidu, 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu oraz 5 mg cynku w postaci glukonianu cynku.

- Pozostałe składniki to: mannitol SD100, mannitol M100, hydroksypropyloceluloza, kwas cytrynowy bezwodny, aromat cytrynowy, sukraloza, krzemionka koloidalna bezwodna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Scorbolamid EXTRA Hot:

- jeśli pacjent ma uczulenie na salicylamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne;
- jeśli pacjent ma astmę z polipami nosa;
- jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy i (lub) stany zapalne przewodu pokarmowego;
- jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);
- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia);
- jeśli pacjent ma genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej;
- jeśli pacjent ma kamice nerkową;
- jeśli pacjent ma hemochromatozę (cukrzyca brązowa), niedokrwistość syderoblastyczną, nadmierną ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
- jeśli pacjentka jest w ciąży;
- jeśli pacjentka karmi piersią;
- jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, (poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki), ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye'a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Działania niepożądane

- Działania niepożądane związane z przyjmowaniem salicylamidu. Najczęstsze działania niepożądane występują ze strony przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego. Mogą wystąpić: nudności, wymioty, skurcze w obrębie jamy brzusznej, uczucie palenia za mostkiem, brak łaknienia, biegunka, podrażnienie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy (nadżerki i owrzodzenia), suchota w jamie ustnej, zawroty głowy, senność, bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, wysypka, nadmierna potliwość.
- Leku nie należy stosować u pacjentów, u których kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne wywoływały wysypkę, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa lub wstrząs, gdyż istnieje możliwość wystąpienia tych działań niepożądanych po zastosowaniu leku Scorbolamid EXTRA Hot.
- Działania niepożądane związane z przyjmowaniem kwasu askorbowego: kwas askorbowy zmniejsza pH moczu, co ułatwia wytrącanie się moczianów, cystyny lub szczawianów; kwas askorbowy może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu, badanie kału na krew utajoną).
- Działania niepożądane związane z przyjmowaniem cynku: nudności, wymioty, biegunka; bóle głowy

Ostrzeżenia

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

POLPHARMA S.A.
Pełplińska 19
Starogard Gdański

Galeria

