

Scorbolamid, tabletki drażowane, 20 tabletek

Cena: 19,24 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SCORBOLAMID
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Ból, Gorączka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Scorbolamid to lek stosowany w przeziębieniu i grypie, który łagodzi różnego rodzaju bóle oraz gorączkę.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku są:

- gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą,
- bóle głowy,
- nerwobóle.

Działanie

Lek Scorbolamid zawiera:

- Salicylamid - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
- Rutozyd - wzmacnia naczynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność. Ponadto chroni witaminę C przed utlenieniem i dlatego witamina C dłużej działa.
- Kwas askorbowy (witamina C) - uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w czasie zakażeń.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: zwykle 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są salicylamid, kwas askorbowy i rutozyd.

- 1 tabletkę drażowaną zawiera 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbowego oraz 5 mg rutozydu.
- Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, woda oczyszczona; otoczka: sacharoza, talk, guma arabska, żółcień chinolinowa (E104), воск Carnauba i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Scorbolamid:

- jeśli pacjent ma uczulenie na salicylamid, niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma astmę z polipami nosa; - jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy i (lub) stany zapalne przewodu pokarmowego;
- jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);
- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia);
- jeśli pacjent ma genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej;
- jeśli pacjent ma kamicy nerkową;
- jeśli pacjent ma hemochromatozę (cukrzyca brązowa), niedokrwistość syderoblastyczną, nadmierną ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu;
- jeśli pacjentka jest w ciąży;
- jeśli pacjentka karmi piersią;
- u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit:

- nudności,
- wymioty,
- skurcze w obrębie jamy brzusznej,
- uczucie palenia za mostkiem,
- brak łaknienia,
- biegunka,
- podrażnienie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy (nadżerki i owrzodzenia),
- suchość w ustach.

Zaburzenia układu nerwowego:

- zawroty głowy,
- senność,
- bóle głowy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:


- zaczerwienienie twarzy,
- wysypka,
- nadmierna potliwość.

Ostrzeżenia

Lek Scorbolamid zawiera sacharozę i żółcień chinolinową (E104). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może powodować reakcje alergiczne.

Producent

POLPHARMA OTC
Pełplińska 19
Starogard Gdański



SCORBOLAMID
Soliyaskum + Askun askocian + Rutaskun, 300 mg + 100 mg + 5 mg, tabletki drażynkowe

LEK NA OBJAWY PRZEZIĘBIENIA I GRYPY

Dzieln: ✔ przeciwbólowo
✔ przeciwwgorkczkowo
✔ przeciwwzpalnie

20 tabletek drażynkowych