

Sebidin Intensive 5 mg + 5 mg, bez cukru, 20 tabletek do ssania

Cena: 34,32 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SEBIDIN
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki do ssania
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antybakteryjne (przeciwbakteryjne), Przeciwbólowe, Znieczulające
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Sebidin Intensive to dostępny bez recepty lek przeznaczony do ssania, który jest skuteczny w leczeniu bólu gardła oraz zakażeń jamy ustnej i gardła. Każda tabletki zawiera dwie substancje czynne: chlorheksydyny dichlorowodorek oraz benzokainę, w odpowiednich dawkach dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

Wskazania

Miejscowe leczenie objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwbakteryjne i miejscowo znieczulające.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: ssać 1 tabletkę co 2 godziny.

Skład

1 tabletki do ssania zawiera:

- substancje czynne: chlorheksydyny dichlorowodorek 5 mg, benzokaina 5 mg,
- pozostałe składniki: mannitol, celuloza mikrokryształiczna (PH 101), powidon K29/32, magnezu stearynian, sodu cyklamian (E 952), sodu sacharynian (E 954), aromat mentolowy 611072E, aromat pomarańczowy 90103-71.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku.
- Nie podawać: dzieciom poniżej 12 lat, pacjentom chorym na methemoglobinemię (chorobę krwi związaną z powstaniem nieprawidłowej hemoglobiny, niezdolnej do przyłączania i przenoszenia tlenu; najczęstszym jej objawem jest sinica, powstająca w wyniku niedotlenienia tkanek) lub methemoglobinemia w wywiadzie medycznym.

Działania niepożądane

- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): podrażnienie języka oraz błony śluzowej jamy ustnej.
- Częstość nieznana: methemoglobinemia, reakcje alergiczne dotyczące skóry i błony śluzowej, utrata apetytu, zaburzenia smaku (rzadko trwałe), zaburzenia oddychania, przekrwienie błony śluzowej nosa, podrażnienie gardła, brązowe przebarwienie zębów, języka, nudności, niestrawność, ból brzucha, biegunka, suchość

w jamie ustnej, pieczenie języka, mrowienie języka, zwiększone odkładanie się kamienia nazębnego, wysypka, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie skóry, brązowe przebarwienie wypełnień dentystycznych, protez dentystycznych i innych aparatów stosowanych w jamie ustnej.

Ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów:

- z nietolerancją estrowych środków miejscowo znieczulających (zwłaszcza pochodnych kwasu para-aminobenzoowego, PABA), parabenów lub p-fenylenodiaminy, gdyż mogą oni wykazywać nadwrażliwość na benzokainę,
- w podeszłym wieku, ciężko chorych lub osłabionych ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych benzokainy.
- ciężkim urazem błony śluzowej jamy ustnej, ze względu na zwiększone wchłanianie środka znieczulającego.
- z zapaleniem przyzębia ze względu na zwiększone odkładanie kamienia naddziąsłowego.
- u których wypełnienie zęba jest szorstkie lub o nierównych brzegach ze względu na ewentualność jego odbarwienia.

Producent

OMEGA PHARMA