

Senamina 12,5 mg, 14 tabletek powlekanych

Cena: 42,54 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SENAMINA
Opakowanie	14 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Ułatwiające zasypianie, Uspokajające (wyciszające)
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Senamina 12,5 mg to doustny lek w postaci tabletek powlekanych, przeznaczony dla dorosłych. Jest stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia sporadycznej bezsenności, pomagając ułatwić zasypianie.

Wskazania

Preparat jest wskazany w krótkotrwałym, objawowym leczeniu sporadycznie występującej bezsenności u dorosłych wywołanej:

- trudnościami z zasypianiem,
- częstymi przebudzeniami nocnymi,
- wczesnym budzeniem w godzinach porannych związanych ze stresem bądź zmianą stref czasowych.

Działanie

Nasenne, uspokajające.

Dawkowanie

Dorośli: 1-2 tabletek (12,5–25 mg) przyjmowane 30 minut przed snem.

Skład

1 tabletki zawiera:

- substancja czynna: doksyamina wodorobursztynianu 12,5 mg,
- pozostałe substancje: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokryształiczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza (15 mPa s), polidekstroza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), maltodekstryna, trójglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, czerwień koszenilowa, lak (E 124), żółcień pomarańczowa, lak (E 110), żółcień chinolinowa, lak (E 104).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na doksylaminę lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu oraz inne leki przeciwhistaminowe. Stosowanie jest przeciwwskazane jeśli u pacjenta występuje: astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli (uporczywy kaszel, któremu towarzyszy odkrztuszanie wydzieliny i śluzu) lub rozedma płuc (trudności w oddychaniu); jaskra (zwiększone ciśnienie w oku); rozrost gruczołu krokowego; utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego; zwężenie przewodu pokarmowego z powodu wrzodu trawiennego bądź zwężenie odźwiernikowo-dwunastnicze; ciężkie zaburzenia czynności nerek i wątroby.

Działania niepożądane

- Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób): senność.
- Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób): niewyraźne widzenie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, nasilenie wydzielania śluzu w oskrzelach, suchość w ustach, zaparcia, zatrzymanie moczu, bezsenność, pobudzenie, zawroty głowy, ból głowy, ból w górnej części brzucha, zmęczenie.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób): podwójne widzenie, szumy uszne (dzwonienie w uszach), hipotonia ortostatyczna (obniżenie ciśnienia krwi spowodowane zmianami pozycji ciała), nudności, wymioty, biegunka, wysypka skórna, osłabienie (uczucie zmęczenia), obrzęki obwodowe (rąk i nóg), koszmary senne, duszność (skrócenie oddechu), niestrawność, uczucie zrelaksowania.
- Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi, pobudzenie (szczególnie u osób w podeszłym wieku), drżenie, napady drgawkowe.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): złe ogólne samopoczucie.

Ostrzeżenia

- Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
- Zapoznaj się z „Informatorem dla pacjenta” dołączonym do ulotki, aby ocenić, czy możesz samodzielnie stosować ten preparat.
- Preparat powinien być stosowany jedynie krótkotrwale (jak najkrócej) i wyłącznie w zalecanych dawkach.
- Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni.
- Wystąpienie senności w ciągu dnia jest wskazaniem do zmniejszenia dawki lub przyjmowania jej odpowiednio wcześniej, tak aby zapewnić co najmniej 8 godzin na sen po przyjęciu preparatu.
- W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Alkohol może nasilać hamujący wpływ doksylaminy na ośrodkowy układ nerwowy.
- Nie należy stosować preparatu u chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Należy zachować ostrożność u chorych z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby i zmniejszyć dawkę do 12,5 mg na dobę.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Galeria

