


Septogard, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml

Cena: 10,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 ml
Postać	Aerozol
Producent	FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Septogard to aerozol stosowany w jamie ustnej, który działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, co pomaga redukować obrzęk. Substancją czynną preparatu jest chlorowodorek benzydamin, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Septogard znajduje zastosowanie w łagodzeniu bólu gardła, leczeniu owrzodzeń jamy ustnej oraz bólu zęba. Może być używany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania aerozolu Septogard jest leczenie bolesnych schorzeń jamy ustnej czy gardła, typu: owrzodzenia śluzówki jamy ustnej, ból gardła, zęba, ból dziąseł.

Działanie

Septogard działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, powodując również zmniejszenie obrzęku przez hamowanie stanu zapalnego. Zawarty w leku benzydamin chlorowodorek należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Skład

- Substancją czynną leku jest benzydamin chlorowodorek.
- 1 ml leku zawiera 1,5 mg substancji czynnej, natomiast 1 dawka aerozolu to 0,225 mg benzydamin chlorowodoru.
- Substancje pomocnicze: glicerol, etanol, metylu parahydroksybenzoesan (E218), sacharyna sodowa (E954), sodu wodorowęglan, polisorbat 20, aromat miętowy SC-5230-AT (maltodekstryna i mentol), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Septogard u osób z nadwrażliwością na chlorowodorek benzydamin lub którykolwiek z pozostałych składników.



Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 na 1 000 osób): drętwienie i (lub) pieczenie w jamie ustnej i (lub) w gardle.
- Bardzo rzadko występujące (u mniej niż 1 na 10 000 osób): trudności w oddychaniu i świszczący oddech; swędzenie; wysypka na skórze; reakcje nadwrażliwości, które mogą być związane ze swędzeniem, któremu towarzyszy czerwona łuszcząca się wysypka, niekiedy z pęcherzami.
- Częstość nieznana: zaczerwienienie lub obrzęk skóry; reakcja alergiczna (nadwrażliwość).

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem w przypadku osób, u których występowała lub występuje astma oskrzelowa czy alergia oraz uczulonych na kwas acetylosalicylowy albo inne NLPZ.
- Septogard zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218), mogący powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek posiada w składzie niewielką ilość alkoholu etylowego, poniżej 100 mg w dawce.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Po pierwszym otwarciu nie stosować dłużej niż 12 miesięcy.

Producent

Farmak International Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
biuro@farmakinternational.pl