

Septogard 3 mg, smak cytrynowy, 20 pastylek twardych

Cena: 11,42 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SEPTOGARD
Opakowanie	20 pastylek
Postać	Pastylki
Producent	FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból gardła
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Septogard 3 mg o smaku cytrynowym zawiera benzydaminę chlorowodorek jako substancję czynną. Jest przeznaczony do miejscowego leczenia objawowego ostrego bólu gardła u dorosłych oraz dzieci od 6. roku życia.

Wskazania

Miejscowe leczenie objawowego ostrego bólu gardła.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać 1 pastylkę 3 razy na dobę w celu złagodzenia bólu.

Składniki

- Substancją czynną leku jest Benzydaminę chlorowodorek. Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg Benzydaminę chlorowodoru (co odpowiada 2,68 mg Benzydaminę).
- Pozostałe składniki leku to: Izomalt (E 953), Kwas cytrynowy jednowodny, Aspartam (E 951), Żółcień chinolinowa (E 104), Aromat cytrynowy, Olejek eteryczny miętowy.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Septogard smak cytrynowy:

- jeśli pacjent ma uczulenie na benzydaminę chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Działania niepożądane

Niezbyt często:

- nadwrażliwość na światło słoneczne (powodująca wysypkę lub poparzenia słoneczne)

Rzadko:

- pieczenie lub suchość w jamie ustnej. Jeśli tak się zdarzy, można wypić szklankę wody dla osłabienia tego uczucia

Bardzo rzadko:

- trudności w oddychaniu lub połykaniu, wysypka, świąd, pokrzywka lub obrzęk twarzy, dłoni i stóp, oczu, warg i (lub) języka, zawroty głowy (obrzęk naczynioruchowy)
- trudności w oddychaniu (skurcz krtani lub oskrzeli)

Częstość nieznana:

- reakcja alergiczna (nadwrażliwość)
- ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami, takimi jak: trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą zagrażać życiu. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza w najbliższym szpitalu
- miejscowa utrata wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej (niedoczulica)

Producent

FARMAK