

Silcontrol 25 mg, 4 tabletki powlekane

Cena: 16,47 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	SILCONTROL
Opakowanie	4 tabletki
Postać	tabletki powlekane
Producent	ZENTIVA K.S.
Przeznaczenie	Wspomagające sprawność seksualną, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Silcontrol to preparat dla dorosłych mężczyzn stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji. Jego substancja czynna, syldenafil, pomaga rozkurczać naczynia krwionośne w prąciu, zwiększając przepływ krwi podczas podniecenia seksualnego. Silcontrol, dostępny bez recepty, umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie w przypadku wcześniejszego pobudzenia seksualnego. Zaburzenia erekcji (impotencja) polegają na niemożności osiągnięcia lub utrzymania wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku płciowego. Silcontrol należy przyjąć około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Opakowanie zawiera 4 tabletki, z których każda zawiera 25 mg syldenafilu.

Wskazania

Lek Silcontrol 25 mg stosuje się u dorosłych mężczyzn:

- w leczeniu impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

Działanie

Zwiększanie napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Silcontrol to 25 mg(1 tabletka).

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: 25 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu),
- substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian, krzemionka

- koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa;
- otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotyna (E 132), lak.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na sylденаfil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Przyjmowanie azotanów, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
- Przyjmowanie leków uwalniających tlenek azotu (np. azotyn amylu, tzw. poppers).
- Przyjmowanie leku riociguat stosowanego w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego.
- Ciężka choroba serca lub wątroby.
- Niedawno przebyty udar lub zawał serca.
- Niskie ciśnienie tętnicze krwi.
- Rzadkie choroby oka (takie jak dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki np. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki retinitis pigmentosa).
- Stwierdzenie kiedykolwiek utraty wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic, przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane

- Bardzo często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy.
- Często występujące działania niepożądane (u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, wrażliwość na światło, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa, ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku, krew w moczu, ból rąk lub nóg.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy się zapoznać z narzędziem diagnostycznym (ankietą).
- Leku Silcontrol nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
- W przypadku występowania dolegliwości sercowych, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.
- W przypadku nieprawidłowości w budowie prącia, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Producent
ZENTIVA