

Skinoren 200 mg/ g, krem, 30 g (import równoległy Delfarma)

Cena: 66,00 zł

Opis słownikowy



Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 g (tub.)
Postać	krem
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Złuszczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Krem Skinoren to lek przeznaczony do leczenia trądziku i przebarwień skóry. Zawiera kwas azelainowy, który ma działanie przeciwbakteryjne, redukuje liczbę zaskórników oraz hamuje nadmierne rogowacenie naskórka. Skinoren jest odpowiedni dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania kremu Skinoren jest leczenie trądziku pospolitego oraz przebarwień skóry.

Działanie

Skinoren zawiera kwas azelainowy, który działa przeciwbakteryjnie (hamuje rozwój bakterii *Propionibacterium acnes*), hamuje nadmierne rogowacenie naskórka, zmniejsza ilość wolnych kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry oraz zmniejsza liczbę zaskórników. Ponadto kwas azelainowy hamuje wzrost i nadmierną aktywność nieprawidłowych komórek barwnikowych naskórka (melanocytów).

Dawkowanie

Zwykle stosowane dawkowanie kremu Skinoren to 2 razy dziennie (rano oraz wieczorem) cienka warstwa leku naniesiona na chorobowo zmienioną skórę. 2,5 cm pasek kremu (ok. 0,5 g) wystarcza do zastosowania na całą twarz. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry, należy zmniejszyć ilość stosowanego kremu lub ograniczyć się do stosowania raz na dobę. W razie konieczności przerwać stosowanie leku na kilka dni.

Skład

- Substancją czynną jest kwas azelainowy (Acidum azelaicum).
- Substancje pomocnicze: kwas benzoesowy (E 210), cetearylu oktanonian, glicerol 85%, glicerylu stearynian + alkohol cetylostearylowy + cetylu palmitynian + makroglicerolu kokosany (CUTINA CBS), glikol propylenowy, woda oczyszczona, makroglicerydów stearynian.

Przeciwwskazania



Nie stosować leku Skinoren u osób z nadwrażliwością na kwas azelainowy, glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Bardzo często występujące działania niepożądane (u 1 lub częściej na 10 osób): uczucie pieczenia, rumień w miejscu podania, świąd.
- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): podrażnienie w miejscu podania, ból, suchość skóry, łuszczenie się skóry, odbarwienie skóry.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): trądzik, zapalenie łojotokowe skóry, parestezje, zapalenie skóry, uczucie dyskomfortu, obrzęk w miejscu podania.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): nadwrażliwość na leki.

Ostrzeżenia

- Podczas stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami, ustami i błonami śluzowymi.
- Po każdorazowym stosowaniu kremu, należy umyć ręce.
- Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.
- Lek zawiera kwas benzoesowy, który może podrażniać skórę, oczy i błony śluzowe.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz w temperaturze poniżej 30°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 6 miesięcy.

Producent

Bayer Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa