

Slow-Mag 60 tabletek



Cena: 19,18 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SLOW-MAG
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ETHIFARM SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Drażliwość, Niedobór minerałów, Osteoporoza, Skurcze, Zmęczenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Slow-Mag to produkt leczniczy, który dostarcza magnez w postaci tabletek dojelitowych. Ten rodzaj tabletek pozwala na uniknięcie dolegliwości żołądkowych, co jest korzystne dla osób z chorobą wrzodową żołądka, ponieważ lek rozpuszcza się dopiero w jelicie. Slow-Mag jest stosowany w przypadkach niedoborów magnezu, które mogą objawiać się m.in. drżeniem mięśni, uczuciem znużenia oraz zaburzeniami snu.

Wskazania

Profilaktyka i stany niedoboru magnezu.

Działanie

Magnez jest podstawowym regulatorem cyklu komórkowego. Jest aktywatorem wielu enzymów. Odgrywa ważną rolę w procesie skurczu mięśni. Wpływa korzystnie na proces krzepnięcia krwi. Wywiera działanie uspokajające.

Dawkowanie

Zapobiegawczo: 2 tabletki na dobę (1 tabletko rano i 1 tabletko wieczorem).

Przy stwierdzonym niedoborze magnezu:

Dorośli: przez pierwsze 3 tygodnie 6 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem), następnie 3 tabletki wieczorem.

Dzieci powyżej 6 lat: według zaleceń lekarza.

Skład

1 tabletko zawiera: 535mg chlorku magnezowego sześciowodnego tj. 64mg jonów magnezu oraz substancje pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian oraz składniki otoczki: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylu etylu 1:1), dibutylo sebacynian, talk.

Przeciwwskazania



Kiedy nie stosować Slow-Mag:

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek magnezu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli występuje podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia),
- jeśli występuje znaczne niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub miastenię (miastenia gravis).

Ostrzeżenia

- Związki magnezu działają przeczyszczająco, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania leku. Przewlekła biegunka wywołana długotrwałym stosowaniem leków zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej (utrata wody i składników mineralnych).
- Podawanie leku pacjentom z niewydolnością nerek może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie i zatrucia magnezem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

ETHIFARM
Bułgarska 65A
Poznań