

Slow-Mag B6 50 tabletek



Cena: 19,18 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SLOW-MAG
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ETHIFARM SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Niedobór minerałów, Niedobór witamin
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Slow-Mag B6 to produkt leczniczy, który jest wskazany do stosowania w sytuacjach niedoboru magnezu i witaminy B6, objawiających się m.in. uczuciem zmęczenia, drżeniem mięśni i wzmożoną drażliwością. Produkt ten pomaga w zaspokojeniu zapotrzebowania organizmu na te składniki odżywcze, które są istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania.

Wskazania

Profilaktyka oraz stany niedoboru magnezu i witaminy B6.

Działanie

Magnez jest podstawowym regulatorem cyklu komórkowego. Jest aktywatorem wielu enzymów. Odgrywa ważną rolę w procesie skurczu mięśni. Wpływa korzystnie na proces krzepnięcia krwi. Stymuluje mechanizmy obronne organizmu, wywiera działanie uspokajające.

Dawkowanie

Dorośli (profilaktyka): 1 tabletkę rano, 1 tabletkę wieczorem.

Dorośli (w niedoborach): 5 tabletek na dobę w dawkach podzielonych - 2 tabletki rano, 3 tabletki wieczorem przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancje czynne: magnezu chlorek sześciowodny i pirydoksyny chlorowodorek (64 mg jonów magnezu w postaci magnezu chlorku sześciowodnego oraz 5 mg witaminy B6 w postaci pirydoksyny chlorowodorku),
- substancje pomocnicze: wapnia węgiel strącony, powidon, talk, magnezu stearynian,
- otoczka: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutyli sebacynian, talk.



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Slow-Mag B6:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na chlorek magnezu, chlorowoderek pirydoksyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli występuje podwyższone stężenie magnezu w organizmie (hipermagnezemia),
- w przypadku znacznego niedociśnienia tętniczego lub zaburzeń przewodnictwa nerwowego,
- w przypadku ciężkiej niewydolności nerek lub w miastemii,
- podczas stosowania lewodopy.

Działania niepożądane

- Zaburzenia żołądkowo-jelitowe m.in. działanie przeczyszczające.

Ostrzeżenia

- Lek należy stosować ostrożnie, nadmiar magnezu może mieć działanie przeczyszczające.
- Podawanie leku osobom z niewydolnością nerek może prowadzić do zatrucia magnezem.
- Nie należy stosować leku z innymi produktami zawierającymi magnez oraz witaminę B6.
- Przewlekła biegunka spowodowana nadmiarem jonów magnezowych może prowadzić do zaburzeń gospodarki elektrolitowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Hiacyntowa 39
60-175 Poznań