

Smecta proszek do sporządzania zawiesiny, 3,76g 10 saszetek

Cena: 11,17 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 saszetek
Postać	Proszek
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbiegunkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Smecta to lek stosowany w leczeniu ostrej biegunki u dzieci powyżej 2. roku życia i dorosłych, a także przewlekłej biegunki czynnościowej u dorosłych.

Wskazania

- Ostra biegunka u dzieci, niemowląt, dorosłych,
- Przewlekła biegunka czynnościowa u dorosłych.

Działanie

Smecta poprzez swoją strukturę i dużą lepkość powleka silnie błonę śluzową przewodu pokarmowego, co wzmacnia barierę ochronną przed m.in. patogenami i czynnikami drażniącymi. Diosmektyt dodatkowo adsorbuje gazy jelitowe, endotoksyny, bakterie i wirusy; przywraca właściwą przepuszczalność błony śluzowej.

Dawkowanie

- Dzieci powyżej 2. roku życia (biegunka ostra): 2 saszetki na dobę, na początku leczenia ostrej biegunki dawka może być podwojona.

Sposób przygotowania: zawartość saszetki rozpuścić w 50 ml wody i podawać małymi porcjami w ciągu dnia. Smectę może również wymieszać z pokarmami półpłynnymi (bulion, przeciery, gotowane owoce, gotowymi daniami dla dzieci).

- Dorośli (biegunka ostra): 3 saszetki na dobę, na początku leczenia w ostrej biegunce, dawka może być podwojona.



Sposób przygotowania: zawartość saszetki rozpuścić w połowie szklanki wody.

- Dorośli (przewlekła biegunka czynnościowa): dawka dobową to 9 g, czyli 3 saszetki.

Skład

- Substancją czynną jest: diosmektyt (glinokrzemian) (Diosmectite).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Smecta:

- jeśli pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- zaparcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- wysypka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- pokrzywka (swędząca wysypka).

Częstość nieznana:

- reakcje alergiczne (zaczerwienienie skóry, świąd, obrzęk, trudności w oddychaniu, omdlenia, zapaść).

Ostrzeżenia

- Nie stosować leku w przypadku nietolerancji niektórych cukrów oraz gdy w przeszłości występowały ciężkie zaparcia; lek zawiera glukozę i sacharozę.
- Należy skonsultować się z lekarzem jeśli nie nastąpi poprawa w ciągu 3 dni w przypadku biegunki ostrej.
- Podczas leczenia biegunki ważne jest odpowiednie nawodnienie, obejmujące m.in. dużą ilość słonych lub słodkich napojów (zapotrzebowanie na wodę u dorosłych wynosi 2 litry). Podczas biegunki należy powstrzymać się od przyjmowania pokarmów do momentu ustąpienia biegunki (należy wykluczyć surowe owoce i warzywa, pikantne dania, mrożone dania).
- Nie zaleca się długotrwałego i częstego stosowania leku Smecta bez konsultacji z lekarzem.

Producent

IPSEN PHARMA
Al. Jana Pawła II 29
Warszawa