

SmectaGo, smak karmelowo-kakaowy, 8 saszetek

Cena: 25,34 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SMECTA
Opakowanie	8 saszetek
Postać	Saszetki
Producent	IPSEN POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbiegunkowe
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 8 lat

Opis produktu

Opis

SmectaGo to gotowa do spożycia doustna zawiesina, przeznaczona dla dorosłych i dzieci powyżej 8. roku życia. Produkt jest wskazany do stosowania w przypadku ostrej i przewlekłej biegunki. Posiada smak karmelowo-kakaowy.

Dawkowanie

Ostra biegunka:

- Dzieci od 8 do 15 lat włącznie: początkowa dawka to 2 saszetki, następnie 1 saszетка po każdym wolnym stolcu, maksymalnie do 4 saszetek na dobę.
- Dorośli i dzieci powyżej 15 roku życia: początkowa dawka to 2 saszetki, następnie 1 saszетка po każdym wolnym stolcu, maksymalnie do 6 saszetek na dobę.

Przewlekła biegunka lub ból brzucha:

- Dorośli (wyłącznie): do 3 saszetek na dobę (1 saszетка rano, 1 saszетка w południe, 1 saszетка wieczorem), zgodnie z zapotrzebowaniem.

Składniki

1 saszетка zawiera:

- substancję czynną: 3 g diosmektytu,
- pozostałe składniki: aromat kakaowo-karmelowy, guma ksantanowa, kwas cytrynowy jednowodny, kwas askorbinowy, sorbinian potasu, sukraloza, woda oczyszczona,
- skład aromatu kakaowo-karmelowego: mieszanina naturalnych i syntetycznych aromatów, barwnik karmelowy E150d, karmelizowany syrop cukrowy, glikol propylenowy E1520, woda, etanol, kofeina.

Zastosowanie

- Leczenie ostrej biegunki u dorosłych i dzieci powyżej 8 roku życia.
- Leczenie przewlekłej biegunki oraz bólu brzucha u dorosłych.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego wyrobu.
- Nie stosować u dzieci poniżej 8 lat z ostrą biegunką oraz u dzieci z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha.

Ostrzeżenia

- Bez konsultacji z lekarzem, leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie.
- Nie zaleca się długotrwałego ani wielokrotnego stosowania SmectaGo.
- W przypadku wystąpienia zaparcia przerwać stosowanie wyrobu (można wznowić przyjmowanie SmectaGo stosując mniejsze dawki dobowe).
- Nie przekraczać zalecanej dawki dobowej.
- Możliwe działania niepożądane: zaparcia, świąd (swędzenie), wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry, warg, gardła i języka).
- Należy stosować specjalne środki ostrożności podczas stosowania u pacjentów z ciężkimi zaparciami w wywiadzie.
- W przypadku dzieci z ostrą biegunką należy stosować preparat w połączeniu z doustnym płynem nawadniającym (DPN) w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki oraz zapobiegania odwodnieniu.
- W czasie trwania biegunki dziecko powinno przyjmować pokarmy.
- Zaleca się częste podawanie niewielkich, zróżnicowanych posiłków (np. ryż, jajka, mięso, gotowane owoce i warzywa).
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nastąpi zmiana w zachowaniu dziecka, jeżeli objawy biegunki nie ustąpią lub ulegną nasileniu, lub jeżeli wystąpią częste, lub przewlekłe wymioty.
- U osób dorosłych z ostrą biegunką SmectaGo stanowi leczenie uzupełniające nawadniania wodą w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki.
- W czasie trwania biegunki należy kontynuować przyjmowanie pokarmów.
- Zaleca się przyjmowanie niewielkich lekkich posiłków, które nie zawierają tłustych, ciężkich, pikantnych lub stymulujących perystaltykę przewodu pokarmowego pokarmów, a także soków owocowych.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia biegunki u osób starszych lub osłabionych, gdyż może ona prowadzić do znacznej utraty płynów (odwodnienia) u tych pacjentów. Może się to wiązać z poważnymi konsekwencjami.
- W przypadku leczenia pacjentów z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha, u których objawy utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, przed kontynuacją leczenia, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia ich przyczyny.
- Nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami przyjmowanymi doustnie, gdyż może to spowodować obniżenie ich skuteczności.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, lub wyrobach medycznych stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, również tych dostępnych bez recepty.

Ważne wskazówki

- Każda saszetka po otwarciu powinna być przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.
- Nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.
- W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć po kolejnym wolnym stolcu (wypróżnieniu).
- SmectaGo może być stosowana przez kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią po konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania preparatu.

Dodatkowe informacje

SmectaGo zawiera niewielkie ilości (mniej niż 100mg na dawkę dobową) etanolu (alkohol).

Producent

Ipsen Pharma
65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Francja