

Sol lecz.BOCHENSKA jodowo-bromowa 1 kg



Cena: 20,71 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SÓL BOCHEŃSKA
Opakowanie	1 kg
Postać	Proszek
Producent	Z.P.SOLANEK JODOWO-BROMOWYCH "SALCO" SP.J.
Przeznaczenie	Regenerujące (odbudowujące), Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Bocheńska sól lecznicza jodowo-bromowa - proszek krystaliczny

Wskazania

Schorzenia reumatyczne: reumatoidalne zapalenie stawów, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, zapalenie reumatyczne mięśni i ścięgien, zapalenie korzonków nerwowych, schorzenia pourazowe narządu ruchu, w trakcie rekonwalescencji; choroby przemiany materii: dnawe zapalenie stawów, profilaktyka niedoczynności tarczycy, schorzenia ginekologiczne: przewlekłe zapalenie przydatków, schorzenia dermatologiczne, jako środek pomocniczy: łuszczyca, rybia łuska, wyprysk przewlekły, nerwice naczyniowe, choroby układu naczyniowego: zaburzenia ukrwienia obwodowego kończyn, choroby układu oddechowego: przewlekłe choroby dróg oddechowych i zatok obocznych nosa.

Działanie

Ciepła kąpiel mineralna działa na organizm kompleksowo, zarówno na skórę i błonę śluzową, jak i pośrednio na cały organizm. Powoduje rozpułchnienie naskórka, umożliwiając wchłanianie składników mineralnych. Powstający na skórze płaszcz solny dostarcza długotrwałych bodźców osmotycznych, działa antyseptycznie i wspomaga leczenie chorób skóry.

Dawkowanie

Kąpiele (temperatura 35-36°C):

- zaleca się stosowanie roztworu 1-3% (1-3 kg soli na 100 l wody), wyjątkowo w chorobach skóry 6% (6 kg soli na 100 l wody). Leczenie należy rozpocząć od niższego stężenia, a następnie stopniowo zwiększać stężenie. Dla dzieci stężenie roztworu do kąpiei nie powinno przekroczyć 1,5% (1,5kg na 100 l wody), wanna zawiera około 100l wody.

Inhalacje (temperatura 37°C):



- zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu do 3%. Inhalację wykonuje się przez bezpośrednie wdychanie oparów roztworu lub przy użyciu inhalatora (łyżka stołowa zawiera około 10g soli).

Skład

Sól jodowo-bromowa, w tym: jodki nie mniej niż 0,03%, bromki nie mniej niż 0,05%, wapń nie mniej niż 1,5%, magnez nie więcej niż 0,8%, sód nie mniej niż 35%, chlorki nie mniej niż 55%, żelazo nie więcej niż 0,001%, woda nie więcej niż 18%, składniki nierozpuszczalne w wodzie nie więcej niż 0,5%.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować produktu leczniczego:

- w ostrych stanach zapalnych
- w niewydolności krążenia
- w chorobach naczyń wieńcowych
- przy wadach serca
- przy chorobach nowotworowych
- przy czynnych procesach gruźlicowych
- przy nadciśnieniu tętniczym
- przy psychopatii
- przy nadczynności tarczycy

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

SALCO
445
Łapczyca