

Solpadeine 500 mg + 8 mg + 30 mg, 12 kapsułek

Cena: 14,79 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Solpadeine w formie 12 kapsułek to lek zawierający trzy składniki aktywne: paracetamol, kodeinę oraz kofeinę. Efekt terapeutyczny wynika ze współdziałania tych substancji. Paracetamol wykazuje właściwości przeciwbólowe i obniżające gorączkę.

Wskazania

Bóle głowy, migrena, bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, nerwobóle, bóle reumatyczne, ból gardła, objawy grypy i przeziębienia, gorączka.

Dawkowanie

Dorośli: Doustnie, 1-2 kapsułki, podawać do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować dawki leku częściej, niż co 6 godzin ani stosować więcej niż 8 kapsułek w ciągu doby.

Sposób użycia

Ten lek należy zawsze stosować tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Solpadeine:

- u osób z nadwrażliwością (uczuleniem) na paracetamol, kofeinę, kodeinę, inne opioidowe leki przeciwbólowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- u osób z chorobą alkoholową,
- u osób z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek,
- u osób z niewydolnością i depresją oddechową,
- u osób z astmą oskrzelową,
- u osób przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) – leki stosowane w depresji i w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu,
- u osób cierpiących na przewlekłe zaparcia,



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- u dzieci w wieku poniżej 12 lat,
- do łagodzenia bólu u dzieci i młodzieży (w wieku 0 do 18 lat) po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych lub gardłowych w związku z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego,
- u pacjenta bardzo szybko metabolizującego kodeinę do morfiny,
- u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią,
- u pacjentów uzależnionych od opioidów.

Producent

PERRIGO