

Solpadeine Max, tabletki musujące, 12 tabletek



Cena: 31,73 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletki musujące
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Solpadeine Max to musujące tabletki przeciwbólowe zawierające trzy substancje czynne. Paracetamol i kodeina skutecznie łagodzą ból, a kofeina wzmacnia działanie przeciwbólowe paracetamolu. Lek stosuje się w przypadkach, które wymagają silniejszego działania niż standardowe środki dostępne bez recepty, takich jak migrena, rwa kulszowa czy skrócenia. Może być stosowany krótkotrwale u dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia.

Wskazania

Solpadeine Max stosuje się przy: bólach głowy, migrenach z aurą lub bez, bólach zębów (także po ekstrakcji zęba), bolesnych miesiączkach, neuralgii, bólu związanego z uszkodzeniami w wyniku wysiłku i skróceniami, bólu pleców, bólu kości i stawów związanego z zapaleniem stawów i reumatyzmem, rwie kulszowej.

Działanie

Solpadeine Max działa przeciwbólowo, zawierając 3 substancje czynne: paracetamol - oprócz działania przeciwbólowego wykazuje także efekt przeciwwgorączkowy; kodeina - należy do opioidowych leków przeciwbólowych; kofeina - zwiększa działanie paracetamolu.

Dawkowanie

Dorośli: 1 do 2 tabletek rozpuścić w co najmniej połowie szklanki wody (200 ml) i przyjmować co 4-6 godziny, zależnie od potrzeb.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), półwodny fosforan kodeiny (Codeini phosphas hemihydricus) i kofeina (Coffeinum).
- 1 tabletkę musującą zawiera: 500 mg paracetamolu, 30 mg kofeiny i 12,8 mg kodeiny fosforanu półwodnego.
- Substancje pomocnicze: sorbitol (E420), sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny, powidon K-25 i dimetykon 350.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować Solpadeine Max: jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na paracetamol, kodeinę, kofeinę lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u osób, które przyjmują inne leki z paracetamolem i kodeiną; u kobiet karmiących piersią; przy trudnościach z oddychaniem; przy przewlekłych zaparciach; u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat podczas bólu po usunięciu migdałków podniebiennych lub gardłowych; jeśli u wiadomo, że u pacjenta metabolizm kodeiny do morfiny przebiega bardzo szybko.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli: u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek albo alkoholowa choroba wątroby czy zespół Gilbert'a (rodzinna niehemolityczna żółtaczka); pacjent posiada problemy jelitowe, w tym niedrożność jelita; u osób po operacji usunięcia woreczka żółciowego; pacjenta choruje na astmę i jest nadwrażliwy na aspirynę; u pacjenta występuje niedociśnienie, niedoczynność tarczycy, uraz głowy albo podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.
- Solpadeine Max zawiera kodeinę, która może uzależniać przy ciągłym zażywaniu przez ponad 3 dni, ponadto po przerwaniu jej stosowania mogą wystąpić objawy odstawienia.
- Kodeina jest przekształcana za pomocą enzymów wątrobowych do łagodzącej ból morfiny. Niektóre osoby mają zmieniony enzym i może to powodować różnice w ilości powstającej morfiny, a w konsekwencji sile efektu przeciwbólowego oraz działań niepożądanych.
- Solpadeine Max zawiera 427 mg sodu w jednej tabletkie. Pacjenci stosujący dietę z ograniczeniem sodu powinni wziąć to pod uwagę.
- Solpadeine Max zawiera sorbitol, więc jeśli pacjent nie toleruje niektórych cukrów, przed zastosowaniem produktu powinien skonsultować się z lekarzem.

Producent

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa