

Solpadeine, tabletki, 12 tabletek



Cena: 22,31 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwkaszłowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Solpadeine to lek łączący paracetamol, fosforan kodeiny i kofeinę, co pozwala na jego wszechstronne działanie. Wykazuje właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwkaszłowe, a kofeina dodatkowo potęguje efekt przeciwbólowy. Stosowany jest w krótkotrwałym łagodzeniu dolegliwości takich jak bóle głowy, zębów, nerwobóle, reumatyzm oraz stany gorączkowe.

Wskazania

- Bóle głowy, migrena, bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, nerwobóle, bóle reumatyczne, ból gardła, objawy grypy i przeziębienia, gorączka.

Działanie

Działanie lecznicze Solpadeine jest sumą skojarzonego działania trzech substancji czynnych:

- Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
- Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu oraz pobudza ośrodkowy układ nerwowy.
- Kodeina wykazuje działanie przeciwbólowe a także przeciwkaszłowe. Kodeina należy do grupy opioidowych leków przeciwbólowych, łagodząc ból.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1-2 tabletki do 4 razy na dobę. Leku nie przyjmować częściej niż co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu 24 godzin.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, fosforan kodeiny i kofeina (Paracetamolum, Codeini phosphas, Coffeinum).
- 1 tabletki zawiera 500 mg paracetamolu, 8 mg fosforanu kodeiny i 30 mg kofeiny.
- Substancje pomocnicze: magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, potasu sorbinian, powidon, talk, celuloza

mikrokryształiczna, kwas stearynowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na paracetamol, kofeinę, kofeinę, inne opioidowe leki przeciwbólowe lub pozostały ze składników tego leku,
- u osób z następującymi dolegliwościami/chorobami: chorobą alkoholową, ciężka niewydolnością nerek lub wątroby, niewydolnością oddechową i depresją

oddechową, astmą oskrzelową, przewlekłymi zaparciami,

- w przypadku uzależnienia od opioidów, osób szybko metabolizujących kodeinę do morfiny,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci poniżej 12 lat, u dzieci w wieku 0-18 lat po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych / gardłowych (ryzyko obturacyjnego bezdechu śródsewnego),
- jeśli przyjmowane są leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) lub w ostatnich 26 tygodniach były one przyjmowane.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- trudności z oddawaniem moczu,

Częstość nieznana występowania działań niepożądanych:

- nerwowość,
- zawroty głowy, senność,
- niestrawności,
- suchość w jamie ustnej,
- świąd,
- potliwości,
- utrudnione oddawanie moczu.

Producent

Omega Pharma Poland
Aleja Niepodległości 18
Warszawa