

Solpadeine, tabletki musujące, 12 tabletek



Cena: 23,37 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletki musujące
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Solpadeine to lek zawierający trzy składniki aktywne: paracetamol, kodeinę i kofeinę. Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwkaszlowe, skutecznie wspomagając łagodzenie różnych dolegliwości.

Wskazania

Wskazania do stosowania: bóle głowy; migrena; bolesne miesiączkowanie; bóle zębów; nerwobóle; bóle reumatyczne; ból gardła; objawy grypy i przeziębienia; gorączka.

Działanie

- Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.
- Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.
- Kodeina wykazuje działanie przeciwbólowe i działa przeciwkaszlowo. Kodeina należy do grupy leków zwanych opioidowymi lekami przeciwbólowymi, które łagodzą ból.

Dawkowanie

- Dorośli: 1-2 tabletki musujące, podawać do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować dawki leku częściej, niż co 6 godzin ani stosować więcej niż 8 tabletek musujących w ciągu doby.
- W razie potrzeby dzieci w wieku 12 lat i starsze: 1-2 tabletki musujące co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek musujących w czasie 24 godzin.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kodeina i kofeina.
- Jedna tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolium), 8 mg kodeiny fosforanu (Codeini phosphas) i 30 mg kofeiny (Coffeinum).

- Substancje pomocnicze: sorbitol proszek, sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, powidon, sodu laurylosiarczan, dimetykon, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Solpadeine: u osób z nadwrażliwością (uczuleniem) na paracetamol, kofeinę, kodeinę, inne opioidowe leki przeciwbólowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u osób z chorobą alkoholową; u osób z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek; u osób z niewydolnością i depresją oddechową; u osób z astmą oskrzelową; u osób przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) – leki stosowane w depresji i w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu; u osób cierpiących na przewlekłe zaparcia; u dzieci w wieku poniżej 12 lat; do łagodzenia bólu u dzieci i młodzieży (w wieku 0 do 18 lat) po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych lub gardłowych w związku z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego; u pacjenta bardzo szybko metabolizującego kodeinę do morfiny; u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią; u pacjentów uzależnionych od opioidów.

Działania niepożądane

- Rzadko (częściej niż u 1 na 10000 pacjentów ale nie rzadziej niż 1 na 1000 pacjentów): alergie (bez obrzęku naczynioruchowego).
- Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): trudności z oddawaniem moczu, anafilaksję, skurcz oskrzeli u pacjentów uczulonych na aspirynę i inne NLPZ, zaburzenia czynności wątroby, reakcje nadwrażliwości skórnej w tym wysypki skórne, świąd, pocenie, plamicę, pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy, przypadki poważnych reakcji skórnych; toksyczna nekroliza naskórka, zapalenie skóry indukowane lekami, zespół Stevensa-Johnsona, ostra uogólniona osutka krostkowa, sterylny ropomocz (mętny mocz), trombocytopenia.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nerwowości, zawrotów głowy, zaparcia, nudności, wymioty, niestrawności, suchości w jamie ustnej, ostre zapalenie trzustki u pacjentów po cholecystektomii (usunięciu pęcherzyka żółciowego) w wywiadzie, nasilenie bólu głowy w przypadku przedłużonego stosowania, senności, utrudnionego oddawania moczu, w przypadku przedłużonego stosowania kodeiny w wyższych dawkach może wystąpić uzależnienie od leku, poważnego schorzenia, które może powodować zakwaszenie krwi (tzw. kwasica metaboliczna), u pacjentów z ciężką chorobą przyjmujących paracetamol.

Producent

Omega Pharma Poland
Aleja Niepodległości 18
Warszawa