

Solpadeine, tabletki musujące, 24 tabletki



Cena: 43,48 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	24 tabletki
Postać	Tabletki musujące
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Solpadeine to lek zawierający paracetamol, kodeinę i kofeinę, których połączone działanie zapewnia efekt terapeutyczny. Wykazuje właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwkaszlowe, a kofeina dodatkowo wzmacnia jego działanie przeciwbólowe. Preparat przeznaczony jest do krótkotrwałego łagodzenia bólu, takiego jak bóle głowy, zębów, nerwobóle, reumatyzm czy gorączka.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1-2 tabletki musujące do 4 razy na dobę. Leku nie przyjmować częściej niż co 6 godzin, nie stosować więcej niż 8 tabletek musujących w ciągu 24 godzin.

Skład

- Substancjami czynnymi są: paracetamol, fosforan kodeiny, kofeina.
- 1 tabletki musująca zawiera 500 mg paracetamolu, 8 mg fosforanu kodeiny i 30 mg kofeiny.
- Substancje pomocnicze: sorbitol proszek, sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, powidon, sodu laurylosiarczan, dimetykon, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Solpadeine:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na paracetamol, kofeinę, kofeinę, inne opioidowe leki przeciwbólowe lub pozostały ze składników tego leku,
- u osób z następującymi dolegliwościami/chorobami: chorobą alkoholową, ciężką niewydolnością nerek lub wątroby, niewydolnością oddechową i depresją oddechową, astmą oskrzelową, przewlekłymi zaparciami,
- w przypadku uzależnienia od opioidów, osób szybko metabolizujących kodeinę do morfiny,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci poniżej 12 lat, u dzieci w wieku 0-18 lat po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych / gardłowych (ryzyko obturacyjnego bezdechu śródseennego),
- jeśli przyjmowane są leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) lub w ostatnich 26 tygodniach były one

przyjmowane.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- trudności w oddawaniu moczu.

Częstość nieznana:

- zawroty głowy,
- nerwowość, senność,
- niestrawność,
- świąd,
- potliwość,
- suchość w jamie ustnej.

Ostrzeżenia

- Solpadeine powinno być stosowane krótkotrwale ze względu na potencjał uzależniający kodeiny.
- Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku: nadciśnienia, niewydolności nerek/wątroby, stosowania leków hamujących czynność OUN, urazów głowy, zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, niedoczynności tarczycy, niedoczynności kory nadnerczy.
- Lek zawiera sorbitol - należy to uwzględnić w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek zawiera 398 mg sodu w 1 tabletkę - należy to wziąć pod uwagę w zmniejszonej czynności nerek i osób stosujących dietę niskosodową.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Omega Pharma Poland
Aleja Niepodległości 18
Warszawa